

Heteroderis pusilla

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Egypt, Irák, Írán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Pákistán, Saudská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Roste v Egyptě, Saudské Arábii, Iráku, Íránu, Afganistánu, Pákistánu, Turkmenistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu a Kazachstánu jako jednoletka. Dorůstá výšky do 30cm. Povrch může být ochlupený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou zpeřené, dlouhé 2 - 8cm, široké 1 - 2cm, podél okrajů mírně ostnitě, horní listy jsou nedělené, úzce kopinaté a malé. Květenstvím je úbor po 1 - 5ti ks, dlouhé 4 - 7mm, široké 2 - 3mm, za plodu vystoupavé, dlouhé do 1 - 1,4cm, široké 4 - 6mm, zákrov je 2řadý, vnější zákrovní lístky jsou široce vejčité, dlouhé 2 - 4mm, široké 1,5 - 2mm, vnitřní jsou 3 - 4x delší a vně kýlnaté. Plodem je nažka s bílým chmýrem délky 3 - 5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. gymnocephala

<https://www.rostliny.net/>