

Sisyrinchium angustifolium (Badil úzkolistý)

synonyma: Bermudiana angustifolia, Bermudiana graminea, Bermudiana graminifolia, Bermudiana homomalla, Bermudiana iridifolia, Ferraria pulchella, Ferraria violacea, Marica mucronata, Sisyrinchium acuminatum, Sisyrinchium anceps, S. f. album, Sisyrinchium bermudiana, Sisyrinchium bermudiana var. anceps, Sisyrinchium carolinianum, Sisyrinchium cultrifolium, Sisyrinchium excisum, Sisyrinchium gramineum, Sisyrinchium graminoides, Sisyrinchium hibernicum, Sisyrinchium homomallum, Sisyrinchium iridioides, Sisyrinchium membranaceum, Sisyrinchium nuttallii, Sisyrinchium ramosum

čeleď: Iridaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Labrador, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z východu USA. Patří mezi trvalky a roste v trsech. Dorůstá výšky 10 - 25 (i 50)cm. Pod zemí vytváří vláknité kořeny. Stonky jsou zploštělé a mírně křídlaté. Listy vytváří pouze přízemní, mečovitého tvaru, šířky 4mm a špičatým koncem. Květenství je terminální, (1-) 2 - 6tičetné s 2mi toulcovými listeny, vlastní květy modré nebo modrofialové o průměru 2,5 - 3,5cm, ústí koruny je žlutooranžové a konce korunních lístků zubaté. Plodem je kulatá tobolka s černými semeny.

Vyhovují mu vlhká mokřadní místa na plném slunci.

Množí se semeny nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>