

Tanacetum balsamita (Maří list balšámový)

synonyma: *Balsamita balsamitoides*, *Balsamita major*, *Balsamita major* subsp. *balsamitoides*, *Balsamita major* var. *tanacetoides*, *Balsamita suaveolens*, *Balsamita vulgaris*, *Chamaemelum balsamita*, *Chrysanthemum balsamita*, *Chrysanthemum balsamita* var. *tanacetoides*, *Chrysanthemum balsamitoides*, *Chrysanthemum grande*, *Chrysanthemum grandiflorum*, *Chrysanthemum majus*, *Chrysanthemum tanacetifolium*, *Chrysanthemum tanacetum*, *Leucanthemum balsamita*, *Matricaria balsamita*, *Pyrethrum balsamita*, *Pyrethrum balsamita* var. *tanacetoides*, *Pyrethrum balsamitoides*, *Pyrethrum majus*, *Pyrethrum tanacetum*, *T. subsp. balsamitoides*, *Tanacetum balsamitoides*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kolorado, Maine, Malá Asie (Anatolie), Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New York, Nové Skotsko, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Utah, V Evropa, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste ve východní Evropě a jihozápadní Asii jako trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2m. Pod zemí vyváří dlouze vystoupavý oddenek. Lodyhy jsou tuhé, max. řídce větvené. Listy jsou eliptické až podlouhlé, tupé, hrubě vroubkované a mají mátovou chut'. Kvete v úboru o průměru (3,5-) 4 - 5 (i 7)mm v počtu 10 - 100 i více ks, trubkovité květy jsou obouphlavné, žluté, jazykovité zpravidla zakrnělé, pokud se vyvinou, jsou krátké, bílé a samičí. Plodem je obkuželovitá nažka délky (1-) 1,2 - 1,8mm s 5 - 7mi žebry a na vrcholu s cípatým kališním lemem. Používá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *balsamita* (Vratič balzámový pravý)
- subsp. *balsamitoides*

Je mrazuvzdorný. Vyhovuje mu jakákoli neprovlněná půda.

<https://www.rostliny.net/>