

# Tanacetum corymbosum (Kopretina chocholičnatá)

synonyma: Chamaemelum corymbosum, Chrysanthemum corymbiferum, Chrysanthemum corymbosum, Chrysanthemum lanuginosum, Chrysanthemum webbianum, Leucanthemum corymbosum, Pyrethrum corymbiferum, Pyrethrum corymbosum, Pyrethrum corymbosum subsp. achilleae, Pyrethrum corymbosum var. achilleae, Pyrethrum tauricum, Pyrethrum webbianum, T. var. tenuifolium, T. var. webbianum

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Německo, Oregon, Polsko, Švýcarsko, Ukrajina, V Karpaty

Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,2)m. Listy jsou střídavé, peřenosečné až peřenolaločné. Květenstvím je úbor o průměru 1,5 - 2,5cm. Plodem je nažka délky 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. achilleae
- subsp. cinereum
- subsp. corymbosum (Kopretina chocholičnatá pravá)
- 'Festtafel' - velké úbory
- subsp. subcorymbosum

<https://www.rostliny.net/>