

# Tanacetum vulgare (Vratič obecný)

synonyma: Chamaemelum tanacetum, Chrysanthemum asiaticum, Chrysanthemum vulgare, Chrysanthemum vulgare var. boreale, Dendranthema lavandulifolium var. tomentellum, Pyrethrum vulgare, Tanacetum boreale, Tanacetum crispum, T. subsp. boreale, T. var. boreale, T. var. crispum

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Ťan-šan, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Pochází z teplejších částí Evropy a Asie. Patří mezi trvalky. Povrch může být řídce ochlupený. Stonek je přímý, na vrcholu větvený, vysoký (0,3 -) 0,5 - 1,2 (i 1,5)m. Listy jsou střídavé, 2x peřenodílné až peřenosečné, dlouhé 10 - 15cm a při mnutí aromatické. Kvete ve žlutém kompaktním úboru bez jazykovitých květů o průměru 0,7 - 0,9 (i 1,1) seskupeném do okolíku a trubkovité květy jsou oboupohlavné. Plodem je nažka délky (1,2 -) 1,5 - 1,8mm. Používá se v léčitelství a na odpuzování hmyzu. Obsahuje jedovaté látky. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. siculum - endemit Itálie
- subsp. vulgare

Vyhovují mu písčité a hlinité sušší půdy, ale roste i podél vodních toků na plném slunci nebo polostínu.

Množí se dělením trsů nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>