

Poa bulbosa (Lipnice cibulkatá)

synonyma: *Panicum bulbosum* var. *viviparum*, *Poa attenuata* var. *desertorum*, *Poa brizaeformis*, *Poa bulbillifera*, *P. f. vivipara*, *P. subsp. crispa*, *P. subsp. delicatula*, *P. subsp. leucoglossa*, *P. subsp. nevskii*, *P. subsp. perligulata*, *P. subsp. pseudoconcinna*, *P. subsp. vivipara*, *P. var. praecox*, *P. var. psammophila*, *P. var. verticillata*, *P. var. vivipara*, *Poa carniolica*, *Poa cephalonica*, *Poa concinna* var. *carniolica*, *Poa crassipes*, *Poa crispa*, *Poa delicatula*, *Poa desertorum*, *Poa eigii*, *Poa iconia*, *Poa nevskii*, *Poa perligularis*, *Poa praecox*, *Poa psammophila*, *Poa pseudoconcinna*

čeleď: Poaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Finsko, Francie, Georgia, Gruzie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Louisiana, Maďarsko, Makaronésie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Rusko, Západní Virginie

Pochází z Euroasie, do Severní Ameriky byla zavlečena. Může růst jako jednoletka i jako trvalka. Dorůstá výšky (4 -) 20 - 30 (i 60)cm. Stébla jsou na bázi cibulkovitě ztlustlá od nahloučených listových pochev. Přízemní listy, zejména sterilních výhonů, jsou svinuté až štětinovitě a po odkvětu záhy odumírají, stébla jsou jinak tuhá, přímá, jazýčky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství tvoří 2 - 6tičetné klásky s délkou 3,5 - 6mm, bývají zpravidla živorodé, nafialovělorůžové, plevy široce vejčité, přibližně stejné a pluchy nepatrně 5tižilné, na bázi s huninkou chloupků. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. *briziformis*

- subsp. *bulbosa* (Lipnice cibulkatá pravá) - trsy až řídké trsy, výška 20 - 30 (i 40)cm; čepel stébelných listů plochá nebo žlábkovitá, zelená až šedozelená, přízemní listy svinuté, štětinovitě až nitkovité; stéblo pod latou volné; lata hustá až řídká, dlouhá 2 - 8cm, široká do 3cm, klásky zpravidla živorodé; suché travnaté až kamenité stráně, skalky, světlé bory, okraje cest, písčiny

- var. *colorata*

- subsp. *pseudoconcinna* (Lipnice cibulkatá ladná) - drobné husté svazečkovité trsy; výška 10 - 20 (i 30)cm; čepel všech listů štětinovitě svinutá, sivozelená; stéblo až pod latu uzavřené v pochvu; lata hustá, dlouhá až 4cm, široká 1,5cm, klásky bez živorodých prýtů; kamenité svahy a skalky, trávníky na borových hlínách a spraších, stepní stráně

- var. *vivipara*

Patří mezi velmi odolné druhy.

<https://www.rostliny.net/>