

Poa nemoralis (Lipnice hajní)

synonyma: *Agrestis alba*, *Agrostis alba* f. *alba*, *Agrostis alba* var. *alba*, *Agrostis alba* *Agrostis alba*, *Agrostis stolonifera* f. *alba*, *Agrostis stolonifera* var. *alba*, *Agrostis vulgaris* var. *alba*, *Aira elodes*, *Catabrosa elodes*, *Catabrosa helodes*, *Decandolia alba*, *Eragrostis tenuis*, *Festuca capitata*, *Festuca depauperata*, *Milium album*, *Paneion nemorale*, *Poa acmocalyx*, *Poa adjarica*, *Poa alexeenkoi*, *Poa angustifolia* var. *nemoralis*, *Poa asperula*, *Poa balbisii*, *Poa balfourii*, *Poa caespitosa*, *Poa capitata*, *Poa cinerea*, *Poa coarctata*, *Poa debilis*, *Poa firmula*, *Poa glauca* subsp. *glaucantha*, *Poa glauca*, *Poa glaucescens*, *Poa gracilescens*, *Poa hypanica*, *Poa juncea*, *Poa juncoides*, *Poa korshunensis*, *Poa lapponica*, *Poa muralis*, P. f. *glaucantha*, P. f. *tenella*, P. subsp. *alexeenkoi*, P. subsp. *balbisii*, P. subsp. *carpatica*, P. subsp. *coarctata*, P. subsp. *firmula*, P. subsp. *hypanica*, P. subsp. *korshunensis*, P. subsp. *lapponica*, P. subsp. *montana*, P. subsp. *parca*, P. subsp. *subpolaris*, P. var. *acuta*, P. var. *adjarica*, P. var. *agrostoides*, P. var. *alpina*, P. var. *angustifolia*, P. var. *balbisii*, P. var. *carpatica*, P. var. *coarctata*, P. var. *firmula*, P. var. *glaucantha*, P. var. *montana*, P. var. *parca*, P. var. *rigidula*, P. var. *tenella*, P. var. *vulgaris*, *Poa parnellii*, *Poa pilipes*, *Poa polymorpha*, *Poa pratensis* var. *cinerea*, *Poa pratensis* var. *fagetorum*, *Poa pubicalyx*, *Poa scheuchzeri*, *Poa scopulorum*, *Poa subpolaris*, *Poa tenuis*, *Poa x tormentuosa*, *Vilfa alba*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Krym, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Ukrajina, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Patří mezi trvalky. Roste v trsech. Dorůstá výšky 30 - 60 (i 90)cm. Listy má úzké a dlouhé, ploché až svinuté, široké 1,5 - 2,5mm, směřují šikmo vzhůru, nejvyšší stébelného list kolmo odstává od stébla, je zpravidla delší pochvy, má jazýček délky max. dlouhý 0,7mm. Kvete v řídké latě složené z malých klásků, plevy jsou nestejně, dolní šídlovitá, horní kopinatá, pluchy nenápadně 5tižilné, dlouhé 2 - 4,5mm a na bázi s řídkou huninkou. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *glauca*
- subsp. *glaucantha*
- subsp. *nemoralis* (Lipnice hajní pravá) - stébla měkká, hladká; listy zelené, zpravidla ploché, čepel nejvyššího stébelného listu delší pochvy, pochvy hladké, jazýček neznatelný; lata zpravidla jednostranně převislá, dlouhá 4 - 8cm, široká 2 - 4cm, klásky zelené, zpravidla 2 - 4květé, dlouhé 2,5 - 5mm; světlé listnaté lesy, háje, křoviny nebo paseky
- subsp. *rigidula* (Lipnice hajní tuhá) - stébla tuhá, přímá, zejména pod květenstvím mírně draslavá; listy zelené až sivozelené, zpravidla mírně svinuté, čepel nejvyššího stébelného listu bývá stejné délky jako pochva, pochvy hladké nebo mírně draslavé, jazýček občas dlouhý do 0,7mm; lata přímá, rozkladitá, dlouhá do 12cm, široká 8cm, klásky žlutozelené až nafialovělé, 3 - 7mikvěté, dlouhé 3 - 7mm; slunné stráně, skalnaté a kamenité svahy, zdi, okraje lesů

Vyhovují ji zastíněná místa v dobře propustné půdě.