

Poa palustris (Lipnice bahenní)

synonyma: *Aira poiformis*, *Poa adspersa*, *Poa angustifolia* var. *fertilis*, *Poa crocata*, *Poa depauperata*, *Poa effusa*, *Poa fertilis*, *Poa fertilis* f. *coarctata*, *Poa fertilis* f. *pauciflora*, *Poa fertilis* f. *turfosa*, *Poa fertilis* subsp. *exigua*, *Poa fertilis* var. *pauciflora*, *Poa fertilis* var. *turfosa*, *Poa glauca* var. *crocata*, *Poa janczewskii*, *Poa miliacea*, *Poa misera* var. *strictula*, *Poa nemoralis* var. *fertilis*, *P. f. coarctata*, *P. f. pauciflora*, *P. f. turfosa*, *P. subsp. palustris*, *P. subsp. volhynensis*, *P. var. depauperata*, *P. var. effusa*, *P. var. fertilis*, *P. var. strictula*, *Poa pseudonemoralis*, *Poa rotundata*, *Poa serotina*, *Poa serotina* var. *fertilis*, *Poa sphondylodes* var. *strictula*, *Poa strictula*, *Poa volhynensis*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Pochází z Asie, Evropy i Severní Ameriky. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2m. Roste zpravidla v řídkých trsech. Pod zemí vytváří krátké zpravidla sterilní výběžky. Stébla jsou hladká (i draslavá). Nejvyšší stébelné listy mají větší délku než pochvy, víceméně špičatý jazýček délky 2 - 3mm a v úžlabí pochev bývají chomáčky. Kvete v řídké latě složené z oválných klásků postrádající osiny, plevy jsou víceméně stejně velké, dolní i horní mají 3 žilky, pluchy mírně 5tižilné, pod špičkou se žlutavou skvrnou a na bázi s huninkou dlouhých chlupů. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *palustris* (Lipnice bahenní pravá) - výška 0,3 - 1m; stébla hladká; listy zelené, ploché, pochvy hladké; lata řídká, dlouhá 10 - 25cm; luhy, bažinaté louky, prameniště, příkopy, břehy, atp.
- subsp. *xerotica* (Lipnice bahenní suchobytná) - výška 15 - 30 (i 50)cm; stébla hladká až mírně draslavá; listy šedozelelé, ploché až svinuté, pochvy zpravidla mírně draslavé; lata hustá, dlouhá 5 - 15cm; zdi, lomy, náspy, okraje cest

Vyhovují mu vlhké louky.

<https://www.rostliny.net/>