

Poa remota (Lipnice oddálená)

synonyma: *Glyceria norvegica*, *Glyceria remota*, *Hydropoa remota*, *Molinia remota*, *Panicularia remota*, *Poa asiae minoris*, *Poa chaixii* var. *remota*, *Poa sudetica* var. *remota*

čeleď: Poaceae

oblasti: Česká republika, Itálie, Německo, Polsko, Švýcarsko

Roste v trsech (i řidších). Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Povrch je bledězelený až žlutozelený. Listy jsou široké 4 - 8mm, zpravidla náhle špičaté, na vrcholu kápovitě stažené, čepel nejvyššího řádu stébelného listu je 15 - 25x delší než široká, jazýček je dlouhý (1,5 -) 2,5 - 3 (i 4,5)mm, zakulacený, celokrajný nebo drobně vroubkovaný a holý. Květenstvím je řídká lata délky 15 - 30cm, větve laty jsou slabé, dlouhé, nejprve obloukovitě vystoupavé, později obloukovitě převislé, klásky jsou 2 - 3 (i 4)četné, dlouhé 4 - 6mm, plevy úzce kopinaté, přibližně stejně dlouhé, min. na žilkách drsné a pluchy mají na bázi chomáček chloupků.

Vyhovují jí vlhké listnaté lesy, pobřežní křoviny a prameniště.

<https://www.rostliny.net/>