

Onopordum acanthium (Ostropes trubil)

synonyma: Onopordum nervosum

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Alabama, Andalusie, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irák, Írán, Itálie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Jižní Wales, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, S Afrika, Středozeří, SZ Indie, Ťan-šan, Texas, Turkmenistán, Utah, Vermont, Viktorie, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Xinjiang, Západní Virginie

Roste ve středozeří, Evropy a západní i střední Asii jako dvouletka (i tříletky). Dorůstá výšky (0,3 -) 2 (i 3)m a šířky do 1,5m. Povrch je šedě ochlupený. Stonek je vzpřímený, bohatě větvený, široce 2 - 4křídlý a s ostny délky 0,2 - 1cm. Vytváří velkou přizemní růžici trnitých vejčitých až kopinatých oboustranně ochlupených listů s délkou do 30cm. 2. rokem dorůstá výšky, lodyžní listy jsou střídavé, ve šroubovici, přisedlé, vejčité až kopinaté, hluboce chobotnatě laločnaté, ostnitě, zpravidla hustě bíle plstnaté a široké 10 - 50cm. Kvete červenofialovými (i bílými) květy v samostatném 1/2kulovitém úboru o průměru (2 -) 3 - 5 (i 6)cm, délky 2 - 5,5cm, zákrov je několikařadý, světle zelený, zákrovní listy mají odstávající žlutočervené ostny. Plodem je 4 - 5 (i 6)mm dlouhá nažka s chmýrem délky (0,6 -) 0,7 - 0,7 (i 1,1)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. acanthium (Ostropes trubil pravý)
- subsp. gautieri
- subsp. parnassicum

Vyhovují mu okraje cest, louky, náspy, atp. v suché dobře propustné půdě bohaté na živiny na plném slunci a v teple.

<https://www.rostliny.net/>