

Benincasa hispida (Tykev vosková)

synonyma: Benincasa cerifera

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Čína, Havajské ostrovy, Indie, Japonsko, Malajsie, Malé Sundy, Pákistán, V Austrálie, Velké Sundy

Roste v tropech a subtrovech, především v jihovýchodní Asii a pochází zřejmě ze Sundských ostrovů. Patří mezi jednoletky a jednodomé bylinné rostliny. Roste na plazivých čtyřhranných žebernatých lodyhách jako silná liána. Na povrchu má husté drsné chloupy. Dorůstá takto délky až několika metrů. Opory se přichytává díky úponkům. Listy mají dlanitokalnný tvar s 5 - 7mi vejčitě3úhlými laloky, pilovým okrajem, délku 10 - 25cm, šířku 10 - 20cm, řapík má délku 10 - 25cm a je chlupatý. Kvete v paždí listů zvoncovými jednopohlavnými květy se stříbřitě chlupatým kalichem délky 1 - 1,5cm, špičatými kopinatými laloky délky 0,6 - 1,2cm s 5ti korunními lístky délky 3 - 5cm, šířky 2 - 4cm, v průměru dosahuje 8 - 12cm a samčí jsou na dlouhé stopce, dlouhé 5 - 15cm, samičí má délku 2 - 4cm. Plodem je válcovitá bobule délky 0,2 - 0,6 (i 2)m, průměru 10 - 25 (i 30)cm, hmotnosti 2 - 8 (i 30)kg, barva je zelená až šedozeleň, nicméně je pokrytá modrobílou voskovou vrstvou a pichlavými chloupy, dužina má tloušťku pouze 2 - 4cm, má bělavou průsvitnou barvu a nemá výraznou chuť. Obsahuje mnoho semen žlutohnědé barvy délky 1cm a šířky 6mm.

Potřebuje teplo, bohatou zálivku a půdu bohatou na živiny.

Množí se semeny, které je dobré nejdříve na cca 4 hod namočit do teplé vody, dále ve velhku nechat nakláčit a až poté přesunout do zeminy.

<https://www.rostliny.net/>