

Citrullus colocynthis (Kolokvinta obecná)

synonyma: Colocynthis vulgaris, Cucumis colocynthis

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Andalusie, Atlantský oceán, Egypt, Írán, Itálie, Makaronésie, Malá Asie (Anatolie), Pákistán, Severní teritorium, SZ Indie, Texas, V Středozeří

Roste ve východním středozeří, Africe a Asii a Turecku jako plazivá nebo šplhavá trvalka s úponkami. Dorůstá délky 0,5 - 0,8 (i 2)m. Pod zemí vytváří hlízovité mírně zdřevnatělé vytrvalé kořeny. Povrch je ochlupený. Listy jsou střídavé, obrysem vejčité, laločnaté, 1 - 2x peřenodílné až peřenosečné, dlouhé (6 -) 10 - 15cm, široké 6 - 8cm a žilnatina je dlanitě hluboce 3 - 5tilaločná. Květy jsou stopkaté, kalich zvonkovitý délky 4 - 7 (i 8)mm, laloky šířky 5mm, koruna zvonkovitá, světležlutá, dlouhá 8mm, široká 5mm a samičí mají korunní lístky delší než samčí. Plodem je kulovitá bobule průměru (4 -) 5 - 7 (i 12)cm a má žlutozelenou barvu se skvrnami uspořádanými do pruhů a obsahuje mírně vejčitá žlutohnědá semena délky 6mm a šířky 3mm. Chuť je extrémě kyselá.

Potřebuje plné slunce, teplo a sušší půdu.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>