

# Citrullus lanatus (Lubenice obecná)

synonyma: *Citrullus colocynthis* var. *lanatus*, *Citrullus vulgaris*, *Cucurbita citrullus*, *Momordica lanata*

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Austrálie, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kapsko, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Původně pochází z tropické a subtropické jižní Afriky. Patří mezi jednoletky, jednodomé a plazivé rostliny. Lodyha je pokrytá bílými chloupky, hranatá, rýhovaná a dlouhá 0,8 - 5m. Z kólenek vyrůstají 2 - 3x větvené úponky. Listy jsou střídavé, vejčité s 3 - 7 párovými laloky, téměř peřenodílné až peřenosečné, dlouhé 5 - 35cm a řapíky jsou dlouhé 5 - 20cm. Kvete jednopohlavnými květy v paždí listů složených z 5ti okvětních lístků světležluté barvy, samčí mají 2 (i 4)cm stopku, kalich široce zvonkovitý délky 7mm, mají kopinaté laloky délky (3 -) 5mm, korunní lístky jsou žluté, dlouhé (0,7 -) 1,2 (i 1,6)cm, šířky 4mm, samičí květy mají 6cm stopku, kalich i korunu podobnou samčím. Plodem je zelená kulovitá, mírně eliptická bobule délky 20 - 50 (i 70)cm se střídavými světlejšími a tmavšími podélnými nepravidelně ohraničenými pruhy a lesklým povrchem, tloušťka kůry je zhruba 2cm, obsahuje červenou sladkou šťavnatou osvěžující dužinu s hnědočernými kapkovitými semeny délky do 1cm a šířky do 5mm. Plodí asi 3 měsíce po výsevu. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *citroides* - plody malé, dužina bílá, prakticky bez sladkosti
- var. *lanatus* (Tsama) - využívá se jako zelenina

Potřebuje sušší půdu bohatou na živiny, teplo a přímé slunce.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>