

Schweinfurthia

čeleď: Plantaginaceae

Roste od Egypta po Somálsko a Indii. Nejznámějším druhem je *S. papilionacea*.

Schweinfurthia imbricata

oblasti: Omán, Spojené arabské emiráty

Roste na Arabském poloostrově jako jednoletka. Větve jsou vystoupavé, v mládí ochlupené a dlouhé do 15cm. Listy vyrůstají střídavě, jsou vejčité až prakticky kulaté, zakulacené (i s krátkou špičkou), mírně ztlustlé, šedomodré, krátce ochlupené a na bázi klínovité. Květy mají krátkou stopku, vyrůstají v paždí listů, kalich je 2pyský, ochlupený, horní cíp vejčitý, zbývající kopinaté, koruna šklebivá, dlouhá 1cm, bílá, nažloutlá nebo narůžovělá, růžově žilkovaná a horní cíp je 2laločný. Plodem je kulatá tmavěhnědá tobolka.

Vyhovují jí písčité nebo štěrkovitá místa s periodickou závlahou.

Schweinfurthia papilionacea

oblasti: Afganistán, Gudžarát, Írán, Pákistán, Rádžastán

Roste v Pákistánu, Afganistánu, Íránu, Indii a Ománu jako jednoletka nebo trvalka. Dorůstá délky 30 - 60cm. Stonek je vystoupavý, mírně ztlustlý, sivozelený a větvený od báze. Listy vyrůstají střídavě, jsou mírně dužnaté, vejčitě kopist'ovité až prakticky kulaté, zakulacené s krátkou špičkou, mohou být krátce ochlupené, dlouhé 1 - 3cm, široké 0,5 - 2,5cm a báze je sbíhavá v krátký řapík. Květy jsou po odkvětu převislé, horní cíp široce vejčitý s 2ma tupými laloky délky 4 - 5mm, na bázi až srdčitý, spodní pysk 3laločný, dlouhý 7mm, zbývající cípy kopinaté, koruna šklebivá, bílá, růžově žilkovaná a dlouhá 1,2cm. Plodem je kulovitá tobolka.

Vyhovují jí volná písčité nebo štěrkovité půdy s periodickou závlahou.

Schweinfurthia pterosperma

Další informace:

<https://botany.cz/cs/schweinfurthia-papilionacea/>

<https://www.rostliny.net/>