

Pimpinella saxifraga (Bedrník obecný)

synonyma: Pimpinella dissecta

čeleď: Apiaceae

oblasti: Andalusie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Švýcarsko, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Asie, Západní Virginie

Pochází z Britských ostrovů, teplých částí Evropy a západní Asie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 50 (i 80)cm. Kořen je vřetenovitý, rozvětvený, nahnědlý a vydává nepříjemný zápach. Lodyha má jemně rýhovaný povrch a je téměř vyplněná dřevem. Listy jsou 1 (i 2)x lichozpeřené s 3 - 6 jařmy zubatých lístků. Vyskytují se především v přízemí, horní jsou zakrnělé. Kvete bílými nebo narůžovělými květy v okolících. Plodem je vejčitá žebernatá 2nažka délky 2 - 3,5mm. Využívá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. alpina
- subsp. nigra (Bedrník obecný černající) - kořen při naříznutí modrá; přízemní lodyha s řapíky má delší chloupky než subsp. saxifraga; přízemní listy tvoří 5 - 6 párů lístků
- subsp. rupestris (Bedrník obecný skalní) - endemit Krkonoš
- subsp. saxifraga (Bedrník obecný pravý) - kořen při naříznutí nemodrá; přízemní lodyha s řapíky je krátce ochlupená; přízemní listy tvoří 3 - 6 párů lístků; kvete v okolíku složeném z 12 - 20 okolíčků

Vyhovují mu sušší místa s lehkou půdou.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>