

# Sigesbeckia (Sigesbeckie)

čeleď: Asteraceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest botanika J. G. Siegesbecka. Patří mezi jednoletky.

## Sigesbeckia agrestis

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Roste ve střední a Jižní Americe.

## Sigesbeckia andersoniae

oblasti: Michoacán

Roste v Mexiku.

## Sigesbeckia australiensis

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii.

## Sigesbeckia blakei

oblasti: Guerrero

Roste v Mexiku.

## Sigesbeckia bogotensis

oblasti: Kolumbie

## Sigesbeckia bojeri

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

## Sigesbeckia fugax

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

### Sigesbeckia glabrescens

oblasti: Čína, Japonsko, Korea, Vietnam

Roste v Číně, Japonsku, Koreji a Vietnamu.

### Sigesbeckia hartmanii

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

### Sigesbeckia integrifolia

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

### Sigesbeckia jorullensis

oblasti: Bolívie, Karibik, Kostarika, Mexiko

Roste od Mexika po Bolívii, včetně Karibiku jako jednoletka (i krátkověká trvalka). Dorůstá výšky 0,3 - 1,5m. Lodyha je přímá, zpravidla chudě větvená, na bázi zpravidla řídce ochlupená, v horní části žláznatá. Listy jsou 3úhlé až vejčité (horní občas kopinaté), ochlupené, špičaté, celokrajné až pilovité dlouhé 3 - 11 (i 16)cm, široké 2 - 6 (i 11)cm, báze zpravidla srdčitá nebo uťatá a prorostlé, přisedlé nebo i řapíkaté. Květenstvím je chocholík z úborů s 1 - 3,5cm stopkou, má 5 - 6 vnějších zákrovních listenů úzce kopistovitých, dlouhých 0,5 - 1,8cm, žláznatě stopkatých, vnitřních zákrovních listenů bývá více, jsou eliptické až obvejčité, dlouhé 2 - 3,5mm, jazykovité květy samičí v počtu 5 - 8 (i 12)ks, trubkovité jsou oboupohlavné a počtu 8 - 20ks. Plodem je široce obkuželovitá nažka délky 2 - 3,5mm.

Roste v listnatých i jehličnatých lesích ve vyšších nadmořských výškách.

### Sigesbeckia microcephala

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

### Sigesbeckia nudicaulis

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale.

### Sigesbeckia orientalis

oblasti: Afrika, Arabský poloostrov, Austrálie, Havajské ostrovy, Illinois, Indie, Indonésie, Írán, J Čína, Massachusetts, Nový Zéland, Střední Amerika, Ukrajina

Roste v tropech a subtropích Asie, Afriky, Austrálie i Ameriky jako jednoletka. Lodyha je větvená, ochlupená a dlouhá 0,3 - 0,75 (i 1)m. Listy vyrůstají vstřícně, jsou vejčité až podlouhlé, okraje chobotnaté až asymetricky zubaté, špičaté, báze klínovitá až zakulacená a mají řapíky. Květenstvím je úbor průměru 5mm, zákrovní listeny vyrůstají ve 2 řadách, vnější jsou delší, úzce obvejčité až úzce kopist'ovité, žláznatě ochlupené, jazykovité květy jsou samičí a trubkovitě květy jsou oboupohlavné, žluté. Plodem je eliptická nažka délky 3mm.

Vyhovují ji okraje polí, křoviny a okraje lesů.

### Sigesbeckia portoricensis

oblasti: Portoriko

### Sigesbeckia pringlei

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku.

### Sigesbeckia pubescens

oblasti: Čína

Roste v Číně.

### Sigesbeckia repens

oblasti: Oaxaca

Roste v Mexiku.

### Sigesbeckia serrata

oblasti: Argentina, Čile

Roste v Argentině a Čile.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/sigesbeckia-jorullensis/>

<https://www.rostliny.net/>