

Stipagrostis (Koudelovec)

čeleď: Poaceae

Roste v Africe a Asii.

Stipagrostis acutiflora

Stipagrostis amabilis

Stipagrostis anomala

Stipagrostis arachnoidea

Stipagrostis brachyathera

Stipagrostis brevifolia

Stipagrostis ciliata

oblasti: Írán

Stipagrostis damarensis

Stipagrostis dhofariensis

Stipagrostis dinteri

Stipagrostis drarii

oblasti: Izrael

Stipagrostis dregeana

Stipagrostis fastigiata

Stipagrostis foexiana

Stipagrostis garubensis

Stipagrostis geminifolia

Stipagrostis giessii

Stipagrostis gonatostachys

Stipagrostis grandiglumis

Stipagrostis griffithii

Stipagrostis hermannii

Stipagrostis hirtigluma

oblasti: Írán, Izrael

Stipagrostis hochstetteriana

Stipagrostis karelinii

oblasti: Írán

Stipagrostis lanata

oblasti: Izrael

Stipagrostis lanipes

Stipagrostis libyca

Stipagrostis lutescens

Stipagrostis masirahensis

Stipagrostis multinerva

Stipagrostis namaquensis

Stipagrostis namibensis

Stipagrostis obtusa

oblasti: Arabský poloostrov, Čad, Etiopie, Írán, Izrael, Jihoafrická Republika (JAR), Mauretánie, Pákistán

Roste v severní Africe, Mauretánii, Čadu, Etiopii, JAR, západní Asii, Arabském poloostrově a Pákistánu.

Stipagrostis paradisea

oblasti: Írán

Stipagrostis pellytronis

Stipagrostis pennata

oblasti: Írán, Kazachstán

Stipagrostis plumosa

oblasti: Indie, Írán, Izrael, Kavkaz, Omán, Střední Asie, SZ Afrika

Roste od severozápadní Afriky až po Indii v podobě trsnaté trávy. Dorůstá výšky do 30cm. Stébla jsou přímá nebo kolénkatě vystoupavá a pod uzlinami jsou ochlupené. Listy jsou svinuté, ostré, dlouhé 4 - 12cm a široké 0,3 - 0,8mm. Květenstvím je stažená lata, zpravidla v dolní části skrytá v pochvě nejvyššího listu, klásky jsou 1květé, dlouhé 1,1 - 1,5cm, obě plevy podobné, kopinaté, dlouhé 0,9 - 1,5mm, plucha podlouhlá, dlouhá 3,5 - 5,5mm, na vrcholu se 3mi osinami, vrcholová má spirálovitě zkroucenou, holou, dlouhou 0,5 - 1 (i 1,5)cm bazální část, na kterou navazuje terminální část s délkou 2,5 - 6cm, která je péřitě ochlupená, obě postranní osiny jsou holé a dlouhé 1 - 2,5cm. Plodem je obilka délky 1,5 - 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. brachypoda
- var. plumosa

Vyhovují mu suché kamenité svahy, suché trávníky, pastviny i polopouště.

Stipagrostis prodigiosa

Stipagrostis proxima

Stipagrostis pungens

oblasti: Írán

Stipagrostis raddiana

oblasti: Írán, Izrael

Stipagrostis ramulosa

Stipagrostis rigidifolia

Stipagrostis sabulicola

Stipagrostis sahelica

Stipagrostis schaeferi

Stipagrostis scoparia

oblasti: Izrael

Stipagrostis seelyae

Stipagrostis shawii

Stipagrostis sokotrana

Stipagrostis subacaulis

Stipagrostis uniplumis

oblasti: Írán

Stipagrostis vexillifeta

Stipagrostis vulnerans

Stipagrostis xylosa

Stipagrostis zeyheri

Další informace:

<https://botany.cz/cs/stipagrostis-plumosa/>

<https://www.rostliny.net/>