

Satureja hortensis (Saturejka zahradní)

synonyma: *Clinopodium hortense*, *Clinopodium pachyphyllum*, *Satureja altaica*, *Satureja brachiata*, *Satureja filicaulis*, *S. var. distans*, *Satureja laxiflora* subsp. *zuvandica*, *Satureja litwinowii*, *Satureja officinarum*, *Satureja pachyphylla*, *Satureja viminea*, *Satureja zuvandica*, *Thymus cunila*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Connecticut, Česká republika, Delaware, Illinois, Indiana, JZ Asie, Katalánsko, Kentucky, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Německo, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, V Středozeří, Vermont, Virginie, Wisconsin

Roste ve východním středozeří a jihozápadní Asii jako jednoletka (i dvouletky). Dorůstá výšky 10 - 40 (i 60)cm. Lodyha má barvu zelenou nebo nafialovělou a je větvená. Listy jsou tmavězelené, úzce kopinaté až čárkovité, obkopinaté, celokrajné a vydávají nasládlé aroma. Kveté fialovými květy délky 1cm v klasu, kalich je zvonkovitý, nepatrně 2pyský, koruna je bílá, narůžovělá nebo bleděfialová a dlouhá 4 - 7mm.

Vyhovuje jí plné slunce a lehká hlinitopísčítá půda bohatá na živiny.

Množí se semeny. Klíčení obvykle trvá 2 - 3 týdny při teplotě 18 - 20°C.

<https://www.rostliny.net/>