

Bolanthus

čeleď: Caryophyllaceae

Bolanthus chelmicus

Bolanthus cherlerioides

oblasti: Turecko

Roste v Turecku. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou šídlovité, špičaté a dlouhé 3 - 7mm. Květenství je 1 - 3četné, vlastní květy přisedlé, korunní lístky délky kalicha a mají růzovofialové žilky.

Bolanthus creutzburgii

Bolanthus filicaulis

oblasti: Libanon, Palestina, Sýrie

Roste v Palestině, Libanonu a Sýrii v podobě trvalky. Dorůstá výšky 6 - 20cm. Povrch je ochlupený. Vytváří mnoho vzpřímených až poléhavých křivolakých větvených stonků. Listy jsou podlouhlé, špičaté, dlouhé 0,3 - 1,5 (i 2)cm a široké 1 - 2mm. Kalich je ochlupený, cípy kopinaté, špičaté, má velikost 4 - 5mm, korunní lístky jsou vejčité a dlouhé 6 - 7mm.

Bolanthus frankenioides

oblasti: Libanon, Sýrie, Turecko

Roste v Sýrii, Libanonu a Turecku. Povrch je žláznatě ochlupený. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou čárkovité, štětinovité a špičaté. Kvetě samostatnými květy, kalich je trubkovitě zvonkovitý a korunní lístky jsou úzce klínovité a tupé.

Bolanthus fruticosus

oblasti: Egejské ostrovy, JV Evropa, Řecko, Z Asie

Roste v jihovýchodní Evropě, západní Asii, Řecku a Egejských ostrovech. Od báze dřevnatí. Povrch je lepivě ochlupený. Listy jsou ztlustlé, čárkovité a tupé. Květenstvím je chocholík, kalich je válcovitý, lepivý, cípy 3úhlé a tupé, korunní lístky jsou skvrnitě, podlouhlé a tupé.

Bolanthus graecus

oblasti: Egejské ostrovy, JV Evropa, Řecko, Z Asie

Roste v jihovýchodní Evropě, západní Asii, Řecku a Egejských ostrovech. Povrch je žláznatě ochlupený. Listy jsou úzce eliptické, ochlupené a dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je hustá hlávka, kalich je ochlupený a korunní lístky mají růžovofialový pruh.

Bolanthus hirsutus

oblasti: Egypt, Izrael, Libanon, Sinajský poloostrov, Sýrie

Roste v Egyptě, Libanonu, Sýrii a na Sinajském poloostrově v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou ztlustlé, úzce kopist'ovité až podlouhlé, dlouhé 5 - 8mm a na bázi klínovité. Květenstvím je 3 - 5tičetná hlávka, vlastní květy jsou bílé, přisedlé, kalich trubkovitě zvonkovitý a cípy špičaté.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

Bolanthus huber-morathii

Bolanthus intermedius

Bolanthus laconicus

oblasti: Řecko

Roste v Řecku v trsech. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Stonky jsou nevětvené, holé až krátce ochlupené. Listy jsou čárkovité až úzce šídlovité, prakticky tupé a dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je husté 2 - 20tičetné stopkaté klubko.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

Bolanthus mevlanae

Bolanthus minuartioides

oblasti: Turecko

Roste v Turecku v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou šídlovité, tuhé, ostré a dlouhé 3 - 7mm. Květenstvím je 10 - 25tičetná přisedlá hlávka, korunní lístky jsou bílé, úzce kopinaté a dlouhé 5 - 7mm.

Vyhovují mu dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Bolanthus spergulifolius

oblasti: Turecko

Roste v Turecku v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je lepkavě ochlupený. Lodyhy jsou větvené. Listy jsou malé a šídlovité. Květenstvím je krátce stopkatá hlávka, listeny jsou šídlovité, kalich má kopinaté ochlupené cípy, korunní lístky jsou bílé a podlouhlé.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Bolanthus stenopetalus

oblasti: Turecko

Roste v Turecku v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 2cm. Listy jsou k sobě seskupené, vstřícné, čárkovité, krátce ochlupené, dlouhé 2 - 5mm, mají nápadnou centrální žilku a v paždí hlavních listů se vytvářejí svazečky menších lístků. Kvete samostatnými přisedlými květy a mají 5 korunních bílých lístků.

Vyhovují mu vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Bolanthus thessalus

Bolanthus thymifolius

oblasti: Bulharsko, Egejské ostrovy, Řecko, Z Asie

Roste v západní Asii, Bulharsku, Řecku a Egejských ostrovech v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Povrch je krátce lepkavě ochlupený. Listy jsou ztlustlé, úzce kopist'ovité, špičaté a na bázi klínovité. Květenstvím je 3 - 5tičetná hlávka, kalich je ochlupený, korunní lístky bílé a vejčité.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Bolanthus thymoides

oblasti: Turecko

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy se střechovitě překrývají, jsou šídlovité, tuhé, ostré, seskupené do svazečků, hustě žláznatě ochlupené a dlouhé 3 - 7mm. Květenství je 4 - 8mičetné, vlastní květy jsou přisedlé, korunní lístky bílé s růžovofialovými čárkami a podlouhlé.

Vyhovují mu dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Další informace:

<http://skalnicky.kadel.cz/t/kvResult.asp-Rod=Bolanthus.htm>

<https://www.rostliny.net/>