

## Serratula tinctoria (Srpice barvířská)

synonyma: *Carduus argutus*, *Carduus tinctorius*, *Centaurea tinctoria*, *Serratula inermis*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Connecticut, Česká republika, Itálie, JZ Sibiř, Katalánsko, Německo, New York, Polsko, Švýcarsko, Ukrajina

Pochází z Evropy a dále až po jihozápadní Sibiř. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,4 - 0,8 (i 1)m. Lodyha se v horní části větví. Nemá trny. Listy mají vejčitý až kopinatý lyrovitě peřenodílný (i celokrajný) tvar s ostře drobně pilovým okrajem a jsou seskupené zejména pod úbory. Kveté fialovočervenými květy v chocholičnatých úborech o průměru 1 - 1,5cm na koncích lodyh, koruna je červenofialová (i bílá nebo růžová). Plodem je nažka s nažloutlým chmýrem. Patří mezi nejznámější rostliny používané pro barvení textilních vláken ve žlutém odstínu. Patří mezi druhy vyžadující pozornost C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *macrocephala*
- subsp. *monticola*
- subsp. *tinctoria* (Srpice barvířská pravá)

Vyžaduje půdu chudou na živiny, polostín se střídavým vlhkem.

<https://www.rostliny.net/>