

Lannea coromandelica

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Ásám, J Čína, Myanmar (Barma), Pákistán, Srí Lanka, Thajsko

Roste v jižní a jihovýchodní Asii od Srí Lanky po jižní Čínu v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 10 (i 20)m při průměru kmene do 45cm. Povrch je na mladých částech drobně rezavě ochlupený. Větve jsou v mládí tlusté, pokryté jizvami po odpadlých listů. Listy jsou dlouhé 10 - 25cm, lichozpeřené, tvořené (3 -) 5 - 7 (i 9)ti páry lístků, vlastní lístky jsou eliptické až vejčité, špičaté, celokrajné, dlouhé (4 -) 5 - 11,5 (i 14)cm, široké (2,2 -) 2,5 - 4,5 (i 5)cm, báze klínovitá, spodní strana v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 8 - 11 párů žilek, řapíčky jsou dlouhé do 5mm, ale terminální lístek má řapík délky až 3cm. Květenství je dlouhé 7 - 25cm, vyrůstá před listy, je seskupené na vrcholcích větví, listeny jsou 3úhlé až široce vejčité, dlouhé 1 - 1,2mm, vlastní květy žlutozelené, načervenalé, kališní cípy 3úhlé, dlouhé 1mm, korunní lístky eliptické až podlouhlé, dlouhé 2 - 2,5mm, široké 1 - 1,3mm a terč má v průměru 1mm. Plodem je eliptická až mírně ledvinitá zploštělá červená peckovice délky 1 - 1,2cm, šířky 7mm a obsahuje ledvinitá semena délky 7mm a šířky 3mm. Při poranění roní velké množství bílé tekutiny, která tvrdne a gumovatí.

Množí se řízký.

<https://www.rostliny.net/>