

Lindenbergia indica

synonyma: *Bovea sinaica*, *Dodartia indica*, *Lindenbergia abyssinica*, *Lindenbergia nigrescens*, *Lindenbergia pirottae*, *Lindenbergia polyantha*, *Lindenbergia scutellarioides*, *Lindenbergia sinaica*, *Lindenbergia virens*

čeleď: Orobanchaceae

oblasti: Egypt, Etiopie, Írán, Izrael, Jordánsko, Omán, Pákistán, S Indie, Sinajský poloostrov, Somálsko, SZ Indie, V Indie

Roste od Egypta po Somálsko, na Sinajském poloostrově, Izraeli, Jordánsku, dále až v Íránu, Pákistánu a Indii v podobě vzpřímeného vystoupavého nebo převislého polokeře (větvičky pak mohou být dlouhé až 1m). Dorůstá výšky 6 - 25 (i 60)cm. Větve s listy jsou v mládí žláznatě i nežláznatě ochlupené. Listy jsou střídavé, kopinaté, vejčité až prakticky kulaté, tupé až špičaté, pilovité až prakticky celokrajné, dlouhé (0,2 -) 0,7 - 3,5 (i 6)cm, široké (0,1 -) 0,5 - 1,4 (i 4,5)cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé (0,1 -) 0,5 - 1 (i 2,5)cm. Květenstvím je vrcholový hrozen anebo květy vyrůstají samostatně v paždí listů, mají 1 - 6mm ochlupenou stopku, kalich zvonkovitý s krátkou trubicí, dlouhý 3 - 8mm, má 5 symetrických tupých cípů, koruna je pyskatá, žlutá až oranžová, dlouhá 0,8 - 1,8cm, horní pysk uťatý, vykrojený, zpravidla hnědočervený, dolní řasnatý a 3laločný. Plodem je vejčitá tobolka délky 4 - 5 (i 8)mm, široká 2,5 - 3mm, mohou být řídce ochlupené, zakulacené nebo zašpičatělé a obsahuje semena délky 0,3mm a šířky 0,2mm.

Vyhovují mu kamenitá místa, zídky i skály.

<https://www.rostliny.net/>