

# Balanites aegyptiaca

čeleď: Zygophyllaceae

oblasti: Egypt, Izrael, Sikkim

Roste v Africe až Indii v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 3 - 12 (i 15)m. Borka je hladká, zelená anebo rozpraskaná, šedá až tmavěhnědá. Trny jsou jednoduché, zelené a dlouhé až 8cm. Větve jsou v mládí šedozelené, křehké, zeleně až žlutě trnité. Listy jsou 2četné, vlastní lístky mírně obvejčité, mírně asymetrické, zelené, kožovité, v mládí ochlupené, dlouhé 1,5 - 6cm, široké 0,5 - 4cm, báze zúžená, řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm a řapíčky do 5mm. Květenství je prakticky okoličnatý vrcholík velikosti 1,5 - 3,5cm, vlastní květy mají 7mm stopku, barvu žlutozelenou, kališní lístky podlouhlé, vně ochlupené, dlouhé 3mm, široké 1,5mm a korunní lístky jsou podlouhlé. Plodem je červená až žlutočervená eliptická bobule délky 2,8 - 6cm a šířky 1,2 - 4cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aegyptica*/B. *suckertii* - lístky v mládí drobně ochlupené; květenství chudé až bohaté, objevuje se na ztrnovatělých uzlinách
- var. *pallida*/B. *racemosa* - lístky drobně plstnaté; květenství 1 - 5tičetné, objevuje se na ztrnovatělých kolénkách

Nemá specifické nároky na půdu, dokáže přežít záplavy i oheň.

<https://www.rostliny.net/>