

Tragopogon porrifolius (Kozí brada pórolistá)

synonyma: *Tragopogon australis*, T. var. *cupani*, *Tragopogon sativus*, *Tragopogon sinuatus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Kréta, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste ve středozemí jako dvouletka (i trvalka). Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 0,7 (i 1,2)m. Pod zemí vytváří dlouhý řepovitý kořen, který se používá v léčitelství. Stonek může být ochlupený a řidce větvený. Listy jsou střídavé, 1/2objímavé, trávovité, zašpičatělé, zpravidla přízemní, zpravidla zvlněné, vzpřímené, dlouhé (8 -) 10 - 20 (i 25)cm a široké 1 - 2 (i 3)cm. Kvete růžovými až světlefialovými úbory o průměru 4 - 7cm na ztlustlé stopce, zákrov je kuželovitý, později válcovitý, 1řadý, listeny čárkovité, zašpičatělé, v počtu 8ks, dlouhé 3 - 5cm, vlastní květy jsou světlefialové, pouze jazykovité a dlouhé 2,5cm. Plodem je 10tižebernatá nažka se zobánkem délky 3,5 - 4,5 (i 5)cm s chmýrem délky 2,5 - 3,5cm. Při poranění roní latex. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *australis*
- subsp. *cupani*/T. *cupani* - endemit Itálie
- subsp. *eriospermus*/T. *eriospermus*
- subsp. *longirostris*/T. *longirostris*
- subsp. *macrocephalus*
- subsp. *sativus*

Je mrazuvzdorná. Vyhovuje ji okraje cest, louky a úhory.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>