

Marah

čeleď: Cucurbitaceae

Marah fabacea

oblasti: Kalifornie, Nevada

Dorůstá délky až 6m. Dužnatý kořen může dorůst váhy až 100kg. Kvete žlutozelenými až světleběžovými květy. Plody mají v průměru 4 - 5cm a zpravidla obsahují 4 semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. agrestis
- var. fabacea

Marah gilensis

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

Roste v USA jako popínavá trvalka. Dorůstá výšky i více než 1,8m. Listy jsou dlanitě 3 - 7milaločnaté, laloky jsou kopinaté až 3úhlé a na spodní straně ochlupené. Kvete bílými žlutými nebo zelenobílými květy o průměru 0,6 - 1cm se 4mi korunními lístky. Plody mají v průměru 2 - 3cm.

Marah guadalupensis

oblasti: Karibik

Marah horrida

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Kvete bílými květy. Plody jsou eliptické, dlouhé 9 - 20cm a obsahují 6 - 24 semen délky 2,6 - 3,2cm.

Marah inermis

Marah macrocarpa

oblasti: Kalifornie

Dorůstá výšky až 6m. Dužnatý kořen může dorůst váhy až 100kg. Kvete žlutozelenými, béžovými nebo bílými květy. Plody mají v průměru 5 - 6cm a délku 15 - 20cm a obsahují 4 i více semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. macrocarpa

- var. major
- var. micrantha

Marah oreganus

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste na západě Severní Ameriky. Dužnatý kořen může dorůst váhy až 100kg. Kvete žlutozelenými až bílými květy. Plody jsou eliptické průměru 4 - 5cm.

Marah watsonii

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Roste na úpatí Sierry Nevady. Dorůstá výšky až 6m. Dužnatý kořen může dorůst váhy až 100kg. Plody jsou eliptické průměru 6 - 8cm.

<https://www.rostliny.net/>