

# Bessera (Besera)

čeleď: Asparagaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest botanika jménem Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser (1784 - 1842). Pochází z Mexika. Pod zemí vytváří cibulovité hlízky s hnědou slupkou. Listů je pouze několik ks v růžici. Stonek je bezlistý, dutý. Květenstvím je terminální několikakvětý okolík, vlastní květy jsou převislé, 6tičetné a dlouze stopkaté. Plodem je tobolka. Nejznámějším druhem je *B. elegans*.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny, plné slunce a v době vegetace vláhu.

Množí se semeny nebo dceřinými hlízkami.

## Bessera elegans

oblasti: J Mexiko, Střední Mexiko

Roste v Mexiku. Dorůstá výšky 0,6 - 0,7 (i 1)m. Pod zemí vytváří cibulovitou hlízu o průměru 3cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou úzké, trávovité, žlábkovité až stočené a dlouhé 60 - 75cm. Květenstvím je (2 -) 10 - 15 (i 30)tkvětý okolík, vlastní květy jsou dlouze stopkaté, převislé, korunní lístky jsou na bázi spojené v krátkou červenou až oranžovou trubku zakončenou světlou pakorunkou.

## Bessera tenuiflora

oblasti: Kalifornský záliv, Kalifornský záliv sever

Roste v Kalifornském zálivu v Mexiku.

## Bessera tuitensis

oblasti: Jalisco

Roste v Mexiku.

<https://www.rostliny.net/>