

# Aleurites moluccanus (Tungovník molucký)

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Brunej, Čína, Filipíny, Havajské ostrovy, Indie, Japonsko, Kambodža, Karibik, Melanésie, Nový Zéland, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Queensland, Srí Lanka, Thajsko, V Afrika, Vietnam

Roste ve východní a jihovýchodní Asii, Novém Zélandu a Polynésii v podobě stálezeleného stromu s úzce kuželovitou, později klenutější korunou. Dorůstá výšky 10 - 25 (i 40)m. Borka je hnědočervená až tmavěšedá, hluboce rýhovaná až prakticky hladká. Větve jsou rozkladitě převislé až vystoupavé, v mládí ochlupené. Palisty jsou dlouhé 1mm, listy jsou vejčité až mírně kopinaté (i ledvinité nebo se 3 - 5ti laloky), špičaté, dlouhé 6 - 30cm, široké 3 - 28cm, báze klínovitá nebo tupá (i mělce srdčitá) a řapíky jsou dlouhé 3,5 - 16 (i 40)cm. Květenstvím je terminální lata délky 5 - 27cm, listeny jsou dlouhé 2 - 4mm, široké 0,5 - 2mm, samčí květy jsou dlouhé 5 - 9mm, široké 0,5 - 1cm, kališní laloky ochlupené, dlouhé 2,5 - 3mm, široké 1,5 - 3mm, korunní lístky dlouhé 3,5 - 9,5mm, široké 1,2 - 3mm, mají 15 - 26 tyčinek, samičí květy jsou dlouhé 0,6 - 1,1cm, široké 0,7 - 1cm, mají 2 - 6mm ochlupenou stopku, kališní laloky dlouhé 3 - 6mm, široké 2 - 5mm, korunní lístky dlouhé 0,6 - 1,1cm a široké 1,6 - 3mm. Plody jsou zploštělé, široce vejčité až mírně kulovité, dlouhé 4 - 4,5cm, široké 4 - 7, obsahují 1 - 2 obvejčitá našedlá semena délky 2 - 3,2cm a šířky 1,5 - 2,4cm. V tropech plodí 2x ročně.

<https://www.rostliny.net/>