

Leuzea carthamoides (Leuzea saflorová)

synonyma: *Rhaponticum carthamoides*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Altaj, Kazachstán, S Mongolsko, Sajany, Slovensko

Patří mezi endemity pohoří Altaj a východního Sajanu. Patří mezi víceletky. V prvním roce vytváří pouze přízemní listovou růžici. Pod zemí vytváří tmavěhnědý vodorovně větvený kořen vydávající smolné aroma. Dorůstá výšky 0,5 - 1,8 (i 2)m na rýhované lodyze. Listy jsou střídavé, dlouhé do 56 - 63cm, vytvářejí růžici o průměru 50 - 70cm, vlastní list je při zemi řapíkatý, horní přisedlý, okraj je hluboce zpeřeně dělený a má pilový okraj. Kvete v 2. roce v úboru o průměru 4 - 6cm fialovými oboupohlavnými květy. Plodem je eliptická nažka s dvouřadým chmýrem, semena jsou hnědošedá a dlouhá 7mm. Používá se v medicíně. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *eucarthamoides*
- subsp. *orientale*

Vyskytuje se na loukách a pastvinách. Vyhovují jí lehké dobře propustné půdy.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>