

Anisomeles (Medůvka)

čeleď: Lamiaceae

Roste v Číně, Indii, jihovýchodní Asii, Nové Guineji, Austrálii, Tichém a Indickém oceánu a Madagaskaru. Nejznámějším druhem je *A. indica*.

Anisomeles candicans

oblasti: Myanmar (Barma), Thajsko

Roste v Myanmu a Thajsku.

Anisomeles heyneana

oblasti: Bangladéš, Indie

Roste v Indii a Bangladéši.

Anisomeles indica

oblasti: Bangladéš, Filipíny, Himálaj, Indie, Indočína, Indonésie, Jamajka, Laccadive Islands, Madagaskar, Malajsie, Melanésie, Nepál, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Srí Lanka, Tichý oceán, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Malajsii, Indii, Srí Lance, Himálaji, jihovýchodní Asii a Pakistánu jako trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5m. Stonek je několikrát větvený. Listy jsou vejčité, vroubkovaně pilovité, dlouhé 5 - 10cm, široké 3 - 7cm, báze zakulacená až uťatá a řapíky jsou dlouhé do 4cm. Květenství je až 20tičetné, vlastní květy mají 2mm stopku, kalich délky 6 - 8mm, zuby 3úhlé, špičaté, koruna je zelenobílá s růžovými skvrnami a dlouhá 1,5 - 1,7cm. Plodem je oříšek délky 1,8mm.

Anisomeles malabarica

oblasti: Bangladéš, Indie, Indonésie, Malajsie, Papua-Nová Guinea, S Austrálie, Srí Lanka, Thajsko

Roste v Indii, Bangladéši, Srí Lance, Andamanech a Nikobarech, Thajsku, Malajsii, Indonésii, Nové Guineji, Mauriciusi, Réunionu a Austrálii.

Anisomeles salviifolia

oblasti: Nová Guinea, Severní teritorium

Roste na Nové Guineji a v Austrálii.