

Nopalea

čeleď: Cactaceae

Nopalea auberi

Nopalea cochenillifera

oblasti: Pákistán, Střední Mexiko

Roste v Mexiku v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 4 (i 5)m při průměru kmene 15 - 20cm. Články bývají eliptické až obkopynaté, oboustranně zakulacené, zelené, dlouhé 10 - 20 (i 50)cm, široké 5 - 7 (i 12)cm, v areolách s průměrem 2 - 5mm je mnoho glochidií, trny zpravidla postrádá (výjimečně má 1 - 3ks délky 3 - 9mm), listy jsou drobné, šídlovité, dlouhé 3 - 4mm a záhy opadávají. Kveté na koncích článků, vlastní květy mají délku 5 - 6cm, průměr 1,2 - 1,5cm, vnější korunní lístky jsou dužnaté, široce vejčité, největší 3úhlý, červené, dlouhé 0,5 - 1 (i 1,2)cm, široké 5 - 8 (i 9)mm, vnitřní podobné, lžičkovité až vejčité či obvejčité, dlouhé 1 - 1,2 (i 1,5)cm a široké 0,5 - 1cm. Plodem je červená bobule délky 3 - 5cm, šířky 2 - 2,5 (i 3)cm a obsahují semena délky 3 - 5mm a šířky 1,5 - 3mm.

Vyhovují mu suché křoviny, opuštěná pole, pastviny atp.

Nopalea dejecta

oblasti: Sicílie

Kveté růžovými nebo červenými květy.

Nopalea gaumeri

Nopalea guatemalensis

Nopalea inaperta

Nopalea lutea

Další informace:

<https://botany.cz/cs/nopalea-cochenillifera/>

<https://www.rostliny.net/>