

Woodwardia (Vodvardyje)

synonyma: Anchistea, Chieniopteris, Lorinseria

čeleď: Blechnaceae

Dorůstají velikosti 0,5 - 3m.

Pochází z tropů a subtropů severní polokoule.

Množí se výtrusy.

Woodwardia affinis

Woodwardia apogama

Woodwardia areolata

synonyma: Lorinseria areolata

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky. Sterilní listy dosahují délky 40 - 60cm a fertilní 50 - 70cm.

Potřebuje vlhké klima.

Woodwardia cochinchinensis

Woodwardia fimbriata

synonyma: W. chamissoi

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Pochází ze západního pobřeží Severní Ameriky. Řetízkový tvar je viditelný na spodní straně listu.

Woodwardia harlandii

Woodwardia heteropinnata

Woodwardia himalaica

Woodwardia japonica (Vodvardyje japonská)

oblasti: Čína, Japonsko

Woodwardia kempii

Woodwardia latiloba

Woodwardia magnifica

Woodwardia martinezii

Woodwardia maxima

Woodwardia muensteriana

Již vyhynulý druh.

Woodwardia omeiensis

Woodwardia orientalis

oblasti: Filipíny, Himálaj, Japonsko, Tchaj-wan, Vietnam

Roste v Číně, Japonsku, Tchaj-wanu, Vietnamu, Himálaji a Filipínách. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. formosana

Woodwardia prolifera

Woodwardia radicans (Woodwardie kořenatá)

oblasti: Florida, Itálie, JZ Evropa, Kalifornie, Makaronésie, S Afrika

Pochází z jižní Evropy, severní Afriky včetně ostrovů Azory, Madeira (nejhojněji) a Kanárských ostrovů. Převyslé listy jsou kožovité, celkového vejčitého až kopinatého tvaru, délky až 3m, jsou 2x zpeřené s až 30cm lítky. Je přísně chráněný a zařazený do seznamu UNESCO.

Vyhovují jí vlhká polostinná místa ve vavřínových lesích.

Woodwardia semicordata

Woodwardia spinulosa (Vodvardyje ostnitá)

oblasti: Kostarika, Mexiko

Roste od Mexika po Kostariku.

Woodwardia takeoi

Woodwardia unigemmata

oblasti: V Asie

Pochází z východní Asie.

Woodwardia virginica (Vodvardyje virginská)

synonyma: Anchistea virginica

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Roste od Quebecku po Floridu.

Woodwardia yunnanensis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/woodwardia-radicans/>

<https://www.rostliny.net/>