

Canadanthus

čeleď: Asteraceae

Existuje pouze 1 druh.

Canadanthus modestus

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Manitoba, Michigan, Minnesota, Montana, Nový Brunšvik, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Washington, Yukon

Roste v USA a Kanadě jako trvalka. Vytváří plazivé výběžky. Stonky jsou nevětvené, mohou být na bázi ochlupené, na vrcholu žláznatě stopkaté. Listy jsou střídavé, spodní šupinovitě, ostatní na okraji drsné, u špičky žláznaté, dlouhé (1,5 -) 5 - 13cm, široké (0,4 -) 1 - 3 (i 4)cm a ouškatě přisedlé. Květenstvím je úbor v počtu (1 -) 2 - 40ks v latě na žláznatě ochlupených stopkách s 1 - 2 (i 3)mi listeny, vnější zákrovní listeny jsou ohnuté, vnitřní přitisklé, na vrcholcích zašpičatělé a nafialovělé, okvětní lístky jsou samičí, čárkovité, zakulacené, bílé až růžovofialové či fialové, dlouhé 0,7 - 1,1 (i 1,5)cm a terčové květy jsou oboupohlavné, bílé nebo žluté, vrcholek může být nafialovělý a dlouhé 5 - 7mm. Plodem je krátce stopkatá obvejčitá nažka s chmýrem.

Vyhovují jí vlhké lesy, okraje vod, atp. ve vápenité půdě.

Další informace:

<https://botany.cz/cs/canadanthus-modestus/>

<https://www.rostliny.net/>