

Gnaphalium uliginosum (Protěž bažinná)

synonyma: *Dasyanthus uliginosus*, *Filaginella malzii*, *Filaginella pilularis*, *Filaginella uliginosa*, *Filaginella uliginosa* subsp. *sibirica*, *Filago pilularis*, *Gnaphalium aquaticum*, *Gnaphalium castaneum*, *Gnaphalium humifusum*, *Gnaphalium laevissimum*, *Gnaphalium nudum*, *Gnaphalium prostratum*, *Gnaphalium ramosum*, *Gnaphalium sibiricum*, *Gnaphalium tomentosum*, *G. f. condensatum*, *G. subsp. nudum*, *G. subsp. pilulare*, *G. var. pilulare*, *G. var. vaillantii*, *Gnaphalium wirtgenii*, *Gnaphalodes evacinum*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Švýcarsko, Utah, V Asie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Yukon, Západní Virginie

Pochází z Evropy, ale roste až po východní Asii. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 2 - 20 (i 30)cm. Lodyha je poléhavá, zpravidla již od báze rozvětvená. Listy jsou plstnaté z obou stran, dlouhé 1 - 5cm a tvar mají úzce vejčitý nebo kopinatý tvar. Kvete nažloutlými květy v úborech v klubíčkách, samičí jsou dlouhé 1,2 - 1,4mm, oboupohlavné jsou dlouhé 1,1 - 1,4mm a široké 0,2 - 0,4mm. Plodem je eliptická nebo válcovitá nažka délky 0,5 - 0,6mm s chmýrem délky 1,1 - 1,5mm. Patří mezi léčivé bylinky.

Vyhovují jí bažiny a jiné vlhké kyselé půdy bohaté na živiny.

<https://www.rostliny.net/>