

# Gamochaeta

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní i Jižní Americe.

## Gamochaeta aliena

oblasti: Čile

Roste v Čile.

## Gamochaeta ambatensis

oblasti: Catamarca

Roste v Argentině. Stonky jsou nevětvené, ochlupené a stejnoměrně olistěné. Listy jsou obkopynaté, tupé, řídce ochlupené, báze protáhlá a spodní strana hustě ochlupená. Květenstvím je listnatý klas složený z úborů.

## Gamochaeta ambatesis

## Gamochaeta andina

oblasti: Santiago Metropolitan

Roste v Čile v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je bíle ochlupený. Spodní listy jsou husté, úzce kopist'ovité, tupé, dlouhé do 2,5cm a lodyžní jsou čárkovité. Květenstvím je vrcholové klubko složené z válcovitě zvonkovitých úborů délky 0,7 - 1cm a šířky 3mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny, řízkou nebo dělením.

## Gamochaeta andinum

## Gamochaeta antarctica

oblasti: Falklandy, Ohňová země

Roste na Falklandských ostrovech a Ohňové zemi.

## Gamochaeta argentina

oblasti: Rio Grande do Sul, SV Argentina, Uruguay

Roste v Brazílii, Argentině a Uruguayi.

### Gamochaeta argyrinea

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA.

### Gamochaeta axillaris

oblasti: Čile

Roste v Čile.

### Gamochaeta badillana

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele.

### Gamochaeta berteriana

oblasti: Čile

Roste v Čile.

### Gamochaeta boliviensis

oblasti: Bolívie

Roste v Bolívii.

### Gamochaeta camaquensis

oblasti: Rio Grande do Sul

Roste v Brazílii.

### Gamochaeta chamissonis

oblasti: Argentina, Čile, Tichý oceán

### Gamochaeta chilensis

oblasti: Čile

Roste v Čile.

### Gamochaeta chionesthes

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Louisiana, Mexiko, Mississippi, Severní Karolína

Roste v USA, Mexiku a Jižní Americe.

### Gamochaeta depilata

oblasti: Araucanía, Biobío, J Čile, Maule, Neuquén

Roste v Argentině a Čile v různých v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Povrch je v mládí hustě ochlupený. Listy jsou kopist'ovité, hrotité a dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je přetřhovaný klas složený z úborů délky 4mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

### Gamochaeta deserticola

oblasti: Jujuy, Salta, Tarapacá

Roste v Čile a Argentině v trsech. Dorůstá výšky 3 - 10cm. Povrch je hustě ochlupený. Stonky jsou nevětvené. Listy jsou seskupené na bázi, kopist'ovité, zakulacené a na bázi protáhlé. Květenstvím je hustý vrcholový klas složený z bílých úborů a zákrovní listeny jsou vejčité.

Vyhovují jí chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

### Gamochaeta diffusa

oblasti: Čile, Neuquén

Roste v Argentině a Čile.

### Gamochaeta erecta

oblasti: Rio Grande do Sul

Roste v Brazílii.

### Gamochaeta girardiana

oblasti: Rio Grande do Sul

Roste v Brazílii.

### Gamochaeta grazielae

oblasti: Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

### Gamochaeta hiemalis

oblasti: J Brazílie

Roste v Brazílii.

### Gamochaeta humilis

oblasti: Antofagasta, Bolívie, Peru

Roste v Čile, Peru a Bolívii v různých v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou obvejčitě kopistovité, tupé a dlouhé 1cm. Květenstvím je klubko složené ze 3 - 5ti hnědých úborů.

Vyhovují jí středně úrodná a středně vlhká dobře propustná půda na plném slunci.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

### Gamochaeta irazuensis

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice.

### Gamochaeta longipedicellata

oblasti: Jujuy

Roste v Argentině.

### Gamochaeta lulioana

oblasti: Bolívie, Peru

Roste v Peru a Bolívii.

### Gamochaeta malvinensis

oblasti: Falklandy, Ohňová země

Roste na Falklandských ostrovech a Ohňové zemi v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je plstnatý. Listy jsou úzké a dlouhé 1 - 1,8cm. Květenství tvoří mnoho úborů, listeny jsou čárkovité a šídlovité.

Vyhovuje jí středně vlhká a středně úrodná dobře propustná půda na plném slunci.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

### Gamochaeta meridensis

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele.

### Gamochaeta monticola

oblasti: Bolívie, Čile, Neuquén

Roste v Argentině, Čile a Bolívii.

### Gamochaeta neuquensis

oblasti: Los Lagos, Magalhaesův region a chilská Antarktida, Neuquén, Río Negro, Santiago Metropolitan

Roste v Argentině a Čile jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 5 - 12cm. Vytváří více lodyh, ty jsou vystoupavé až přímé, bíle ochlupené a olistěné zejména na bázi. Listy jsou mírně obvejčité, špičaté nebo tupé s hrotem, oboustranně ochlupené, dlouhé 1 - 1,7cm a báze je klínovitá. Květenství tvoří méně než 10 úborů podepřených listem, zpravidla v paždí listů se vytvářejí další 1 - 2 chudší květenství, zákrove je úzce zvonkovitý, dlouhý 4mm, 3 - 4řadý, listeny jsou hnědé, vnější vejčité, ochlupené, špičaté, dlouhé 2mm, vnitřní kopinaté, špičaté, dlouhé 3,5mm, samičích květů je cca 12, jsou nitkovité, žlutobílé, na vrcholu narůžovofialovělé, dále má 4 - 5 oboupohlavných květů, ty jsou trubkovité, žlutobílé, dlouhé do 3mm a vrchol růžovofialový. Plodem je nažka s chmýrem délky do 3mm.

Vyhovují jí horské svahy a sutě, dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

## Gamochaeta nigrevestis

oblasti: JV Brazílie

Roste v Brazílii.

## Gamochaeta nivalis

oblasti: J Argentina, J Čile, Střední Čile, SZ Argentina

Roste v Čile a Argentině v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Povrch je plstnatý. Listy jsou kopisťovité, tupé, přisedlé a dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství tvoří válcovité úbory velikosti 5mm, zákrovní listeny jsou úzce vejčité a tupé.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

## Gamochaeta oligantha

oblasti: Santiago Metropolitan, Valparaíso

Roste v Čile v kobercových porostech. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Povrch je bíle ochlupený. Listy jsou úzce kopisťovité, hrotité a dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství tvoří 1 - 3 úbory, jsou válcovité, dlouhé 3mm a zákrov je bleděžlutý.

Vyhovují mu skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

## Gamochaeta oreophila

oblasti: Peru

Roste v Peru v růžicích a trsech. Dorůstá výšky 1 - 6cm. Spodní listy jsou přisedlé, obkopynaté, špičaté až zakulacené, ochlupené, dlouhé 1 - 4cm, křídlatě řapíkaté a spodní strana je plstnatá. Květenství je klasovité složené z úborů o velikosti 3 - 4mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

## Gamochaeta paramora

## Gamochaeta platensis

oblasti: J Brazílie, SV Argentina, Uruguay

Roste v Uruguayi, Argentině a Brazílii.

### Gamochaeta polybotrya

oblasti: J Argentina, J Čile, Střední Čile

Roste v Čile a Argentině. Povrch je ochlupený. Stonky jsou nevětvené, na bázi olistěné. Vlastní listy jsou úzce kopist'ovité s hrotem. Květenstvím je klásek složený z úborů v paždní horních listů.

### Gamochaeta procumbens

oblasti: Střední Čile

Roste v Čile.

### Gamochaeta rizzinii

oblasti: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul

Roste v Brazílii.

### Gamochaeta serpyllifolia

oblasti: Biobío, Maule, Mendoza, Neuquén, O'Higgins

Roste v Čile a Argentině. Povrch je plstnatý. Listy jsou obvejčité až mírně kopist'ovité, hrotilé a dlouhé 0,3 - 1cm. Květenstvím je hlávka v paždní listů složená ze 3 - 6ti úborů délky 3 - 4mm.

### Gamochaeta simplicaulis

### Gamochaeta simplicaulis

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Nový Zéland, Severní Karolína

Pochází z Jižní Ameriky, zavlčená byla do USA a na Nový Zéland. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky do 85cm. Listy jsou zelené, dlouhé do 9cm a na spodní straně ochlupené. Květenství tvoří 2 - 3 žluté úbory bez jazykovitých lístků.

### Gamochaeta spiciformis

oblasti: J Argentina, J Čile, Střední Čile

Roste v Čile a Argentině v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou kopist'ovité, hrotilé a prakticky holé. Květenstvím je 1/2kulatý klas složený z válcovitě zvonkovitých růžových úborů velikosti 3mm s tmavě růžovofialovým zákrovem.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny, řízkou nebo dělením.

### Gamochaeta stachydifolia

oblasti: Argentina, Brazílie, Čile, Tichý oceán, Uruguay

Roste v Brazílii, Argentině, Čile, Uruguayi a ostrovech Juana Fernandéze jako jednoletka. Dorůstá výšky do 15cm. Listy jsou dlouhé do 3cm. Květenství tvoří 2 - 4 žluté úbory bez jazykovitých květů.

### Gamochaeta stagnalis

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Guatemala, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Mexiko, Mississippi, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v Mexiku, Guatemale a USA jako jednoletka. Dorůstá výšky do 35cm. Listy jsou dlouhé do 3cm. Květenství tvoří 3 - 4 žluté úbory bez jazykovitých květů.

### Gamochaeta suffruticosa

oblasti: Coquimbo

Roste v Čile. Povrch je bíle ochlupený. Listy jsou husté, čárkovité, podlouhlé až kopist'ovité, dlouhé do 1,5cm a přisedlé. Květenstvím je přisedlé klubko z úzce zvonkovitých úborů.

### Gamochaeta thouarsii

oblasti: Atlantský oceán

Roste na ostrově Tristan da Cunha.

### Gamochaeta valparadisea

oblasti: Valparaíso

Roste v Čile.

### Gamochaeta villarroelii

oblasti: Santiago Metropolitan

Roste v Čile. Povrch je ochlupený. Listy jsou úzce kopist'ovité, zašpičatělé s hrotem, šedozelené a dlouhé 2cm. Květenstvím jsou válcovitě zvonovité úbory délky 3mm umístěné v paždí vrcholových listů.



Další informace:

<https://botany.cz/cs/gamochoeta-neuquensis/>

<https://www.rostliny.net/>