

Carlina acaulis (Pupava bezlodyžná)

synonyma: *Carlina alpina*, *Carlina cirsioides*, *Carlina officinalis*, *Carlina subacaulis*, *Chromatolepis acaulis*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alpy, Česká republika, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, Rakousko, S Řecko, Švýcarsko, Ukrajina, Z Rusko

Pochází z Alp střední a jižní Evropy. Patří mezi trvalky. Stonek vytváří zkrácený, poléhavý nebo vystoupavý, vysoký (1 -) 10 - (i 15)cm. Listy vytvářejí přízemní růžici o průměru kolem 20 (i 60)cm, jsou hluboce peřenosečné až peřenolaločné s 9 - 13ti párovitými úkrojky a ostnitým zakončením a spodní strana bývá ochlupená. Kvete v úboru o průměru (4 -) 4,5 - 6 (i 10)cm, okvětní lístky jsou čárkovité, mají stříbrobílou barvu okolo hnědobílého středu, vnější se podobají listů, prostřední jsou kopinaté, šupinovité, vnitřní suchomázdřité a lesklé, vlastní květy jsou trubkovité, bílé či načervenalé a lůžko má silné kyjovité chlupy. Za deště se úbor zavírá. Plodem je nažka s chmýrem dvojnásobné délky nažky. Kořen se využívá v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *acaulis* (Pupava bezlodyžná pravá) - lodyha výšky 10 - 15cm, listy peřenosečné s 9 - 13 úkrojky v přízemní růžici, včetně nekřídlaté; 1 úbor velikosti 4,5 - 6cm barvy bílé nebo načervenalé, variabilní
- subsp. *caulescens* (Pupava bezlodyžná prodloužená) - dorůstá výšky 15 - 60cm; lodyha olistěná; listy peřenodílné až peřenosečné úkrojky přisedajícími na zúženou bázi, včetně nekřídlaté; vnitřní zákrovní lisy jsou stříbřité až nafialovělé, dlouhé 3,5 - 5,5cm; vzácný druh C1
- f. *elongata* - prodloužená lodyha
- subsp. *simplex*
- 'Bronze'

Vyhovují mu sušší louky, vřesoviny, kamenité půdy, atp. na teplém výsluní.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>