

# Cassine viburnifolia

čeleď: Celastraceae

oblasti: Borneo, Filipíny, Malajský poloostrov, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko

Roste v jihovýchodní Asii v porostech mangrovů v podobě keře až malého stromu. Dorůstá výšky do 10cm při průměru kmene do 20cm. Borka je žlutošedá. Listy jsou papírovité až prakticky kožovité, obvejčité až eliptické nebo i prakticky kulaté, špičaté, tupé nebo zakulacené, řídce vroubkované až prakticky celokrajné, dlouhé 4 - 10,5cm, široké 2 - 6cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,3cm. Květenstvím je až 11cm dlouhý vrcholík na až 6cm stopce, vlastní květy mají 1 - 2cm stopku, jsou bílé, 4 (i 5)tičetné, kališní laloky téměř volné, široce vejčité až téměř kulaté, průměru 1mm, korunní lístky jsou podlouhlé až mírně vejčité, tupé, dlouhé 1,7 - 2mm, široké 1 - 1,3mm a terč má průměr 1,5mm. Plody jsou obvejčité, zpravidla na řezu kosočtvercovité, někdy zploštěné, dlouhé 1,2cm, široké 6mm, obsahují zpravidla 1 mírně obvejčité semeno délky 6mm a šířky 3mm.

<https://www.rostliny.net/>