

Toona sureni (Česnekovník Sureňův)

synonyma: *Cedrela celebica*, *Cedrela febrifuga*, *Cedrela febrifuga* var. *assamensis*, *Cedrela febrifuga* var. *glabrior*, *Cedrela febrifuga* var. *pealii*, *Cedrela febrifuga* var. *verrucosa*, *Cedrela sureni*, *Cedrela toona* var. *henryi*, *Surenus febrifuga*, *Swietenia sureni*, *Toona ciliata* var. *candollei*

čeleď: Meliaceae

oblasti: Bhútán, Čína, Indie, Malesie, Myanmar (Barma), Nepál, Thajsko

Roste v Indii, Nepálu, Bhútánu, Myanmaru, Číně, Thajsku a po Malesii v podobě stromu se širokou rozkladitou občas hustou korunou. Dorůstá výšky do 40m při obvodu kmene do 3m s výškou do 25m. Borka je bělavá, šedohnědá, šedá nebo bleděhnědá, zpravidla svisle rýhovaná a odlupující se. Větve mají nápadné lenticely. Listy jsou zpeřené, dlouhé 29 - 84cm, tvořené zpravidla 6 - 12ti páry lístků, řapíky jsou dlouhé 7 - 20cm, vlastní lístky jsou kopinaté až vejčitěkopinaté, celokrajné, zašpičatělé, dlouhé 7 - 20cm, široké 3 - 8cm, mohou být ochlupené, báze může být asymetrická a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1,2cm. Květenství je převislé, dlouhé do 40cm, vlastní květy mají 0,3 - 1,3mm stopku, délku 4 - 5mm, kalich má velikost 1 - 1,5mm, vně může být ochlupený, kališní lístky bývají 3úhlé, špičaté, na okraji ochlupené, dlouhé 0,6 - 1mm, korunní lístky jsou bílé, světle béžové neb narůžovělé, dlouhé 3,5 - 5mm a široké 1,6 - 3,2mm. Plodem je tobolka délky 1,4 - 2,4cm obsahující oboustranně okřídlená semena délky 1,1 - 2,2cm, šířky 3 - 5mm, kde tělo má délku 5 - 8mm a šířku 1,5 - 2mm.

<https://www.rostliny.net/>