

# Acanthocalycium

čeleď: Cactaceae

Existují pouze 3 druhy. Pochází z Argentiny. Rodové jméno pochází z řeckého akantha = pichlavý a kalyx = poupata. Rostou v kulovém, mírně válcovém tvaru s plochým zakončením. Tělo tvoří 16 - 20 žeber. V průměru dosahují rozměrů 10 - 15cm a výšky až 60cm. Areoly měří 1 - 2cm a nabývají žlutohnědé barvy.

## Acanthocalycium cintiensis

oblasti: Argentina

Roste v Argentině.

## Acanthocalycium ferrarii

synonyma: A. variiflorum

## Acanthocalycium klimpelianum

synonyma: A. klimpelianum var. macranthum, A. peitscherianum, A. spiniflorum f. klimpelianum, A. spiniflorum var. klimpelianum, Echinopsis klimpeliana, Echinopsis peitscherana, Echinopsis peitscheriana, Lobivia klimpeliana, Lobivia spiniflora var. klimpeliana, Lobivia spiniflora var. macrantha, Lobivia spiniflora var. peitscheriana

oblasti: S Argentina

Domovinou těchto rostlin je provincie Cordoba v Argentině. Pojmenováno po Georgu Klimpelovi, pěstiteli kaktusů v Berlíně. Dorůstá výšky 8cm a průměru 10cm. Kulovité tělo tvoří 17 žeber. Kvete bílým květem o průměru až 5cm. Semena jsou uložena v ostnatém semeníku.

Pěstování v našich podmínkách nečiní potíží, pokud pěstujeme v propustném substrátu. Zimujeme při 10°C v naprostém suchu.

## Acanthocalycium spiniflorum

synonyma: A. violaceum, Echinocactus spiniflorum, Echinocactus spiniflorus, Echinopsis spiniflora, Echinopsis violacea, Lobivia spiniflora, Lobivia spiniflora var. violacea

oblasti: S Argentina

Druhové jméno odvozeno z latinského violaceum = fialový. Je tím míněna fialová barva květu. Domovinou těchto rostlin je pohoří Siera Cordoba v Argentině, kde rostou soliterně. Dorůstá výšky 20 (i 60)cm a šířky 12 - 14cm. Tělo je kulovité, ve stáří mírně válcovité, světlezelené až žlutozelené, s 15 - 20ti žebry s hloubkou 1,5cm, areoly jsou eliptické, s (10 -) 18 (i 20)ti jehlovitými světle okrovými až nahnědlými trny délky 3cm. Květy vyrůstají z temene, jsou světle fialové, délky až 7,5cm, průměru 5cm, kalich je otrněný, stejně tak jako plod s kulovitými černými semeny. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. violaceum

Pěstujeme v propustném substrátu, s nárazovitou zálivkou. Zimujeme v chladu při 10°C bez zálivky.

Množí se semeny.

Další informace:

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/acanthocalycium-violaceum>

<https://www.rostliny.net/>