

Ariocarpus retusus (Ariokarpus tupý)

synonyma: Anhalonium areolosum, Anhalonium elongatum, Anhalonium furfuraceum, Anhalonium prismaticum, Anhalonium pulvilligerum, Anhalonium retusum, Anhalonium trigonum, Ariocarpus confusus, Ariocarpus elongatus, Ariocarpus elongatus subsp. horacekii, Ariocarpus furfuraceus, Ariocarpus furfuraceus f. cristata, Ariocarpus furfuraceus var. rostratus, Ariocarpus prismaticus, Ariocarpus prismaticus var. maior, Ariocarpus prismaticus var. minor, Ariocarpus pulvilligeris, A. subsp. confusus, A. subsp. scapharostroides, Ariocarpus trigonus, Ariocarpus trigonus var. elongatus, Ariocarpus trigonus var. horacekii, Mammillaria furfuracea, Mammillaria prismatica

čeleď: Cactaceae

oblasti: Nuevo León, Tamaulipas, Texas

Roste v Mexiku a USA. Dorůstá šířky (5 -) 10 - 12 (i 25)cm, ale zpravidla z 1/2 schovaný v zemi. Povrch je nahnědlý, s bradavkami délky 3 - 8cm a s ochlupenými areolami. Kvete bílými nebo narůžovělými květy s růžovým pruhem uprostřed. Plody obsahují černá semena velikosti 1mm s jamkou. Je zapsaný v seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. elongatus - dlouhé bradavky
- var. furfuraceus
- var. retusus
- subsp. trigonus - Nuevo León
- 'Elongatus'

Potřebuje plné slunce, přes léto bez zálivky, na jaře pouze mírná a plná na přelomu léta a podzimu. Substrát by měl být štěrkovitý.

<https://www.rostliny.net/>