

Taxandria conspicua

čeleď: Myrtaceae

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají zpravidla samostatně, jsou eliptické, oboustranně zúžené, špičaté, krátce tupě hrotité, na bázi ochlupené, dlouhé 0,7 - 2,5cm, široké 2 - 6mm a řapíky jsou dlouhé max. 3mm. Květenstvím je svazeček květů v paždí listů nebo na vrcholcích větví, má průměr 0,7 - 1cm, sterilní bazální listy jsou chudé, listy podlouhlé, zpravidla hustě ochlupené, tupé, dlouhé 1,5 - 2mm, listy podlouhlé, zahnuté, na kýlu ochlupené, tupé, dlouhé 1 - 2mm, široké 0,5 - 1mm, vlastní květy mají kališní lístky vejčité 3úhlé, ochlupené, tupé, dlouhé 0,8 - 1,2mm, korunní lístky bílé, nehetnaté, dlouhé 1,5 - 3mm, široké 4 - 9mm, trubka je ochlupená a dlouhá 1,5 - 2mm. Plodenství je kulovité nebo eliptické či válcovité, dlouhé (0,6 -) 1 - 1,5cm, široké 0,8 - 1cm, tobolky jsou široce pohárkovité až obkruželovité, mohou být ochlupené a široké 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *abrupta*/Agonis *spathulata* var. *angustifolia* - Západní Austrálie; výška do 2,5m; větve mohou být ochlupené; listy vzpřímené až mírně odstálé, zpravidla obvejčité, oboustranně zúžené, zašpičaté, krátce tupě hrotité, dlouhé 0,6 - 2,5cm, široké 2 - 5mm; svazečky květů úžlabní nebo vrcholové, průměru 0,7 - 1cm, listy zpravidla podlouhlé (i vejčité), tupé, hustě ochlupené, dlouhé 1,5 - 2mm, listence podlouhlé, nápadně zahnuté, ochlupené, dlouhé 1 - 1,5mm, široké 0,5mm, vlastní květy průměru 4 - 7mm, kališní lístky ochlupené, tupé, dlouhé 0,8 - 1 a korunní lístky podlouhlé a dlouhé 1,5 - 2,5mm; plodenství kulovité, průměru 0,7 - 1cm
- subsp. *conspicua*

<https://www.rostliny.net/>