

# Echinomastus

čeleď: Cactaceae

Pochází z jihozápadu USA a Mexika.

Množí se semeny.

## Echinomastus dasyacanthus

### Echinomastus durangensis

synonyma: *Echinocactus trollietii*, *Echinocactus unguispinus*, *E. mapimiensis*, *Neolloydia unguispina*, *Pediocactus unguispinus*, *Sclerocactus unguispinus*, *Thelocactus unguispinus*

oblasti: Střední Mexiko

Pochází z Duranga, Mexiko. Roste ve vejčitém tvaru o výšce 8 - 10 (i 20)cm při průměru 7 - 9cm. Barva těla je šedozelená a tvoří jej 18 - 20 méně zřetelných žebér s hrbolky. Kvete žlutohnědými květy. Plod je soudkovitě tvarovaný o délce 1cm a průměru 0,5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *mapimiensis*

Množí se semeny, ale v našich podmínkách se především roubují.

### Echinomastus erectocentrus

synonyma: *Echinocactus erectocentrus*, *E. acunensis*, *E. erectocentrus* var. *acunensis*, *Neolloydia erectocentra*, *Neolloydia erectocentra* var. *acunensis*, *Sclerocactus erectocentrus*

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

### Echinomastus gautii

synonyma: *Neolloydia gautii*, *Turbinicarpus gautii*

oblasti: Texas

## Echinomastus hispidus

### Echinomastus intertextus

synonyma: *Echinocactus intertextus*, *Echinocactus intertextus* var. *dasyacanthus*, *E. intertextus* var. *dasyacanthus*, *Neolloydia intertexta*, *Neolloydia intertexta* var. *dasyacantha*, *Sclerocactus intertextus*, *Sclerocactus intertextus* var. *dasyacanthus*

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *dasyacanthus*

### Echinomastus johnsonii

synonyma: *Echinocactus johnsonii*, *Echinocactus johnsonii* var. *lutescens*, *Neolloydia johnsonii*, *Neolloydia johnsonii* var. *lutescens*, *Sclerocactus johnsonii*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah

Pochází z jihozápadu USA. Tělo dorůstá vejčitého tvaru nebo později sloupovitého o výšce až 25cm a průměru 10cm. Povrch je pokrytý až 4cm trny v barvě žluté, šedé, růžové nebo i červené. V jediné areole jich může být až 24. Kvete žlutými nebo růžovými květy o průměru až 8cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *lutescens*

### Echinomastus macdowellii

### Echinomastus mariposensis

synonyma: *Echinocactus mariposensis*, *Neolloydia mariposensis*, *Sclerocactus mariposensis*

oblasti: Texas

### Echinomastus unguispinus

oblasti: S Mexiko

Pochází ze severního Mexika. Jeho tvar je válcovitý až sloupovitý s 21 žebry s hrbolky. Dorůstá výšky až 15cm a průměru až 11cm. Barva povrchu je modrozelená. Kvete hnědočervenými, žlutozelenými nebo zelenými květy o průměru 2,5 - 3cm. Plod je soudkovitý, dlouhý 2,5cm a má průměr 0,6 - 0,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *loui*
- subsp. *minimus*
- subsp. *unguispinus*

### Echinomastus warnockii

synonyma: *Echinocactus warnockii*, *Neolloydia warnockii*, *Sclerocactus warnockii*

oblasti: Texas

Další informace:

[http://www.cact.cz/galerie\\_test/detail.php?id=876](http://www.cact.cz/galerie_test/detail.php?id=876)

[http://www.cact.cz/galerie\\_test/detail.php?id=958](http://www.cact.cz/galerie_test/detail.php?id=958)

[http://www.zelenelisty.cz/clanky/clanky---kaktusy-\\_articles---cacti\\_/echinomastus](http://www.zelenelisty.cz/clanky/clanky---kaktusy-_articles---cacti_/echinomastus)

<https://www.rostliny.net/>