

Chilotríchum

čeleď: Asteliaceae

Roste v Jižní Americe v podobě stálezeleného keře. Listy jsou střídavé, úzké a celokrajné. Květenstvím je dlouze stopkatý úbor a jazykovité květy jsou bílé nebo fialové. Plodem je nažka. Nejznámějším druhem je *Ch. diffusum*.

Chilotríchum angustifolium

oblasti: Čile

Roste v Čile.

Chilotríchum diffusum

oblasti: Čile, Falklandy, Ohňová země

Roste v Čile, Argentině a na Falklandských ostrovech v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 1 (i 1,5)m a šířky až 2m. Borka je šedohnědá a odlupuje se v plátech. Větve jsou v mládí bíle plstnaté. Listy jsou střídavé, přisedlé, husté, obkopinaté, úzce kopinaté až čárkovité, téměř tupé, zpravidla podvinuté, kožovité, tmavězelené, lesklé, v mládí oboustranně šedě plstnaté, dlouhé (0,8 -) 2 - 3 (i 5)cm, široké 2 - 7mm a spodní strana je hnědě plstnatá. Květenstvím je vrcholový samostatný úbor průměru (2,2 -) 2,5 - 3,2 (i 5)cm na 5 - 10cm stopce, zákrovní listeny jsou ve 2 - 3 řadách, vejčité až vejčitékopinaté, špičaté, hnědočervené, plstnaté, dlouhé 3,2 - 9mm, jazykovité květy jsou samičí, bílé, dlouhé 0,7 - 1,2cm a terčové jsou trubkovité, oboupohlavné a žluté. Plodem je podlouhlá 3hranná žláznatá nažka délky 3 - 5mm s nažloutlým chmýrem délky 4,6 - 6,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Siska' - výška 90cm; listy stříbřité; jazykovité květy bílé

Vyskytuje se na okrajích lesů, vlhkých skalách a březích, nebo dokonce i březích rašeliniště.

Chilotríchum rosmarinifolium

oblasti: Araucanía, Aysén, Biobío, Chubut, Los Lagos, Magalhaesův region a chilská Antarktida, Maule, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz

Roste v Čile a Argentině v podobě bohatě větveného stálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,2 - 1 (i 1,5)m. Větve jsou rovné, šedohnědé, v mládí hustě olistěné a bíle plstnaté. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité, zašpičatělé až špičaté, lesklé, zelené, dlouhé 1 - 3cm, široké 1 - 2mm a spodní strana je bíle plstnatá. Květenstvím je vrcholový úbor na 1 - 4cm stopce, zákrovní listeny jsou 2 - 3řadé, úzce kopinaté, tupě špičaté, dlouhé 0,7 - 1,1cm, ochlupené, jazykovité květy jsou samičí, bílé, dlouhé 0,7 - 1,2cm, terčové květy jsou oboupohlavné, trubkovité a žluté. Plodem je 3boká podlouhlá žláznatá nažka délky 3 - 5mm s nažloutlým chmýrem délky 4,5 - 6,5mm.

Vyhovují mu okraje lesů, toků nebo i okraje rašeliniště.

Chiliotrichum tenue

oblasti: Čile

Roste v Čile.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2225>

<https://botany.cz/cs/chiliotrichum-diffusum/>

<https://www.rostliny.net/>