

# Cremanthodium

čeleď: Asteraceae

Roste v Číně, Himálaji, Indii, Nepálu, Bhútánu, Pakistánu a Myanmaru. Květenstvím je zpravidla žlutý převislý úbor. Plodem je nažka.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

## Cremanthodium angustifolium

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Stonky jsou růžovofialovočervené. Listy jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 7 - 23cm, báze sbíhavá a řapíky jsou křídlaté. Květenstvím je žlutý převislý úbor.

Vyhovují jí středně vlhké a mírně úrodné dobře propustné půdy v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

## Cremanthodium arnicoides

oblasti: Džammú a Kašmír, Himáčalpradéš, Nepál, Pákistán, Uttarpradéš, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste v Číně, Indii, Nepálu a Pakistánu v trsech. Dorůstá výšky (10 -) 30 - 40(i 50)cm. Povrch je ochlupený. Přízemní listy jsou vejčité, špičaté, hrubě zubaté, dlouhé (3 -) 8 - 15cm, široké 3 - 4,5cm, řapíky jsou dlouhé do 15cm, lodyžní listy jsou úzce kopinaté, dlouhé 8 - 15cm a široké 2 - 3cm. Květenstvím je žlutý úbor v hroznu s průměrem 5 - 6cm, zákrov je černě ochlupený, zákrovní listy jsou kopinaté nebo eliptické, špičaté, dlouhé 1cm, široké 4mm, okvětní lístky jsou široce eliptické, tupé, dlouhé (1,5 -) 1,8 - 2 (i 2,7)cm a terčové květy jsou dlouhé 8mm. Plodem je nažka s chmýrem délky 6 - 7mm.

Vyhovují jí štěrkovité vlhké půdy v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

## Cremanthodium atrocipitatum

oblasti: Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru. Spodní listy jsou ledvinité, 3roze zubaté, dlouhé 3 - 5cm a na spodní straně dlaniť žilnaté. Květenstvím je převislý úbor s červeným nebo růžovofialovým zákrovem a žlutými okvětními lístky.

## Cremanthodium bhutanicum

oblasti: Arunáčalpradéš, Ásám, Bhútán, V Himálaj, Xizang (Tibet)

Roste v Indii, Bhútánu, Himálaji a Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Listy jsou modrozelené, spodní řapíkaté, čárkovité až kopinaté, tupé, podvinuté, dlouhé 2 - 8cm a spodní strana je šedozelená. Květenstvím je převislý žlutý úbor, okvětní lístky jsou žilkované a dlouhé 1,2 - 1,4cm.

Vyhovují jí vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízkou.

### Cremanthodium botrycephalum

### Cremanthodium brachychaetum

oblasti: Yunnan

Roste v Číně. Listy jsou šedozelené, pomočené, spodní podlouhlé, řídce zubaté, tupé, řapíkaté, dlouhé 2 - 5cm, lodyžní listy jsou přisedlé a podlouhlé. Květenstvím je převislý úbor, okvětní lístky jsou podlouhlé a dlouhé 1,1 - 1,3cm.

### Cremanthodium brunneopilosum

### Cremanthodium bulbiferum

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně. Listy jsou v přízemí ledvinité, mělce vroubkované, růžovofialové, dlouze řapíkaté a široké 1 - 5cm. Květenstvím je až převislý úbor, okvětní lístky jsou obkopinaté a dlouhé 1,2 - 1,8cm.

### Cremanthodium bupleurifolium

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy jsou šedozelené, pomoučené, spodní eliptické, dlouze řapíkaté, dlouhé 4 - 11cm, lodyžní listy jsou přisedlé a obkopinaté. Květenstvím je žlutý převislý úbor s okvětními lístky délky 0,7 - 1,5cm.

Vyhovují jí kamenitá vlhká místa bohatá na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkou.

### Cremanthodium calcicola

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Spodní listy jsou tmavězelené, kulatě ledvinité, vroubkovaně hrotité, řapíkaté a dlouhé 6 - 8cm. Květenstvím je převislý žlutý úbor s tmavě růžovofialovým zákrovem.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná vlhká půda a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

### Cremanthodium campanulatum

oblasti: Myanmar (Barma), Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Stonky jsou růžovofialové. Spodní listy jsou ledvinité, mělce vroubkované nebo laločnaté, na okraji ochlupené a dlouhé 0,7 - 2,5cm. Květenstvím je růžovofialovočervený převislý úbor.

Vyhovují mu středně úrodné a středně vlhké dobře propustné půdy v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

### Cremanthodium chungdienense

#### Cremanthodium citriflorum

oblasti: Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru. Spodní listy jsou ledvinité, drobně vroubkované, tupé, ochlupené, řapíkaté a dlanitě žilnaté. Květenstvím je převislý úbor, okvětní lístky jsou vejčitékopinaté, hnědě žilkované a dlouhé 4 - 5cm.

#### Cremanthodium conaense

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu. Listy jsou modrošedozelené, spodní podlouhlé až obkopinaté, špičaté, drobně zubaté, podvinuté, řapíkaté a dlouhé 2 - 5cm. Květenstvím je převislý úbor s okvětními lístky délky 1,2 - 1,6cm.

#### Cremanthodium cordatum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Listy jsou šedozelené, spodní srdčité, tupé, lepivé, řapíkaté a dlouhé 2 - 9cm. Květenstvím je žlutý převislý úbor, okvětní lístky jsou podlouhlé a dlouhé 1 - 1,2cm.

Vyhovují jí mírně vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

## Cremanthodium coriaceum

## Cremanthodium cremanthodioides

## Cremanthodium cucullatum

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 20 - 25cm. Spodní listy jsou ledvinité, tupé, zubaté, ochlupené, dlanitě žilnaté a dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je žlutý převislý úbor s tmavěhnědým zákrovem.

Vyhovují jí středně úrodné a středně vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny, řízkami nebo dělením.

## Cremanthodium cyclaminanthum

oblasti: Sichuan

Roste v Číně. Spodní listy jsou vejčitěsrdčité, tupé, řapíkaté a lodyžní listy jsou čárkovité. Květenstvím je převislý úbor s hnědě ochlupeným zákrovem, okvětní lístky jsou podlouhlé, tupé a dlouhé 1,1 - 1,3cm.

## Cremanthodium daochengense

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Stonky jsou růžovofialovočervené. Spodní listy jsou kopinaté, hrubě 3roze zubaté, tupé a tmavězelené. Květenstvím je žlutý převislý úbor.

Vyhovují jí vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízkami.

## Cremanthodium decaisnei

oblasti: Bhútán, Indie, Kašmír, Nepál, Pákistán, Qinghai, V Himálaj, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste v Indii, Himálaji, Číně a Nepálu v trsech jako trvalka. Dorůstá výšky (5 -) 12 - 25 (i 30)cm. Stonek je v horní části ochlupený. Spodní listy jsou ledvinité, asymetricky vroubkované, dlanitě žilnaté, dlouhé (1 -) 1,5 - 3 (i 5)cm, široké 2,5 - 5,5cm a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je žlutý převislý úbor, zákrovních listů je 9 - 16 ve 2 řadách, jsou nahnědlé, špičaté, dlouhé 0,9 - 1,6cm, široké 2 - 5mm, okvětní lístky jsou eliptické, krátce zubaté, dlouhé 1,3 - 2cm, široké 5 - 9mm a terčové květy jsou dlouhé 7 - 8mm. Plodem je podlouhlá nažka délky 4mm s chmýrem délky 6,5 - 7mm.

Vyhovují jí kamenité vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

### Cremanthodium delavayi

oblasti: Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru. Spodní listy jsou široce 3rohé, ostře nebo zaobleně zubaté, špičaté a dlouhé 6 - 13cm. Květenstvím je převislý úbor, okvětní lístky jsou úzce kopinaté a dlouhé 2,5 - 4,5cm.

### Cremanthodium discoideum

oblasti: Bhútán, Gansu, Indie, Nepál, Qinghai, Sichuan, V Himálaj, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Indii, Bhútánu, Himálaji a Nepálu. Spodní listy jsou úzce vejčité, tupé, řapíkaté, dlouhé 1,5 - 4cm a na spodní straně šedozelené. Květenstvím je převislý úbor s ochlupeným zákrovem.

### Cremanthodium dissectum

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 25 - 40cm. Spodní listy jsou vejčité, dlouhé 2 - 4cm, peřenosečné, úkrojky úzce kopinaté a zašpičatělé s hrotem. Květenstvím je žlutý převislý úbor, okvětní lístky jsou obkopinaté, uťaté a dlouhé 1,5 - 1,7cm.

Vyhovují jí středně vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

### Cremanthodium ellisii

oblasti: Bhútán, Indie, Nepál, Pákistán, Qinghai, V Himálaj, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste v Himálaji, Číně, Indii a Nepálu v trsech. Dorůstá výšky 5 - 60cm. Spodní listy jsou vejčité až podlouhlé (i lžičkovité), mírně ztlustlé, mohou být zubaté (i laločnaté), sbíhavé, řapíkaté, dlouhé 9 - 25cm, široké 3 - 6cm, lodyžní listy jsou menší a přisedlé. Květenstvím je žlutý až červený převislý úbor v počtu 1 - 5ks s průměrem 5 - 8cm, zákrov je ochlupený, tvoří jej 12 - 15 kopinatých zašpičatělých zákrovních lístků délky 1,2 - 1,5cm, šířky 3 - 4mm, okvětní lístky jsou podlouhlé, dlouhé 1 - 1,7cm a terčové květy jsou dlouhé 6 - 7mm. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. ramosum - Qinghai, Tibet; úbory terčovité
- var. roseum - Sichuan; úbory jazykovité, okvětní lístky červené

Vyhovují jí vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

## Cremanthodium farreri

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Indii, Číně a Myanmaru. Spodní listy jsou ledvinité, mělce vroubkované, zakulacené, řapíkaté, dlouhé 2 - 4cm, lodyžní listy jsou podobné, ale menší. Květenstvím je převislý úbor.

## Cremanthodium forrestii

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Spodní listy jsou hrállovité, špičaté, šedozelené, dlouhé 1 - 5cm a řapíkaté. Květenstvím je žlutý úbor, zákrov je 1/2kulatý, okvětní lístky jsou hnědě žilkované a dlouhé 0,4 - 2,2cm.

Vyhovují ji středně vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

## Cremanthodium glandulipilosum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 8 - 20cm. Spodní listy jsou vejčitékopinaté, špičaté, zubaté, žláznatě ochlupené, řapíkaté a dlouhé 3 - 7cm. Květenstvím je žlutý převislý úbor po 1 - 3ks, okvětní lístky jsou podlouhlé, tupé a dlouhé 1,5 - 2cm.

Vyhovují ji vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny v polostínu a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

## Cremanthodium glaucum

oblasti: Yunnan

Roste v Číně. Listy jsou šedozelené, pomoučené, spodní podlouhlé, špičaté, řapíkaté a dlouhé 3 - 14cm. Květenstvím je převislý úbor, zákrov je šedozelený, okvětní lístky jsou kopinaté, špičaté a dlouhé 1,5 - 2cm.

## Cremanthodium helianthus

## Cremanthodium heterocephalum

## Cremanthodium hookeri

## Cremanthodium humile

oblasti: Gansu, Qinghai, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně. Lodyžní listy jsou bohaté, vejčité až kulaté, tupé, řapíkaté a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je úbor, zákrov je ochlupené, okvětní lístky jsou eliptické, špičaté a dlouhé 1 - 2cm.

## Cremanthodium laciniatum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Lodyžní listy jsou podlouhlé, na okrajích třásnitě, řapíkaté, dlouhé 2 - 6cm, úkrojky podlouhlé a špičaté. Květenstvím je žlutý úbor, okvětní lístky jsou podlouhlé, špičaté a dlouhé 1,7cm.

Vyhovují jí vlhké kamenité půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

## Cremanthodium latilobum

## Cremanthodium lineare

oblasti: Gansu, Sichuan, Xizang (Tibet)

Roste v Číně. Listy jsou modrozelené, spodní čárkovité až úzce kopinaté, špičaté, dlouhé až 23cm, lodyžní jsou bohaté a kopinaté. Květenstvím je převislý úbor a okvětní lístky jsou dlouhé do 4cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. roseum - okvětní lístky růžovočervené

## Cremanthodium lingulatum

## Cremanthodium medogense

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 18 - 38cm. Spodní listy jsou srdčitě ledvinité, špičaté, hrubě zubaté, řapíkaté, dlouhé 1 - 4cm, lodyžní jsou přisedlé a čárkovité. Květenstvím je žlutý převislý úbor.

Vyhovují jí středně vlhké dobře propustné půdy bohatší na živiny a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

## Cremanthodium microglossum

oblasti: Gansu, Qinghai, Yunnan

Roste v Číně. Spodní listy jsou vejčité, tupé, ochlupené a dlouhé 1 - 3cm. Květenstvím je úbor, zákrov je ochlupený a okvětní lístky jsou bílé.

### Cremanthodium microphyllum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10m. Vytváří pouze 2 spodní listy, jsou vejčité, mírně podvinuté, tupé, dlouze řapíkaté, dlouhé 1,5 - 1,7cm, lodyžní listy bývají 2 - 3ks a jsou vejčité. Květenstvím je žlutý úbor, okvětní lístky jsou podlouhlé a dlouhé 1,5cm.

Vyhovují ji kamenité vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkami.

### Cremanthodium nanum

oblasti: Bhútán, Džammú a Kašmír, Kašmír, Ladak, Nepál, Qinghai, Sikkim, Uttarpradéš, V Himálaj, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste v Číně, Indii a Nepálu. Dorůstá výšky do 10 (i 15)cm. Spodní listy jsou kopinaté, vejčité až kulaté, našedlé, ochlupené, dlouze řapíkaté, dlouhé 1 - 1,5 (i 4)cm, široké 0,5 - 1cm, na spodní straně ochlupené, hodní lodyžní listy jsou eliptické, dlouhé 1,5 - 2cm a široké 5 - 8mm. Květenstvím je úbor průměru 2,5cm, zákrovní lístky jsou kopinaté, téměř černé, na bázi ochlupené, dlouhé 1,2 - 1,5cm, široké 3mm, okvětní lístky jsou eliptické, tupé, zubaté, dlouhé 6 - 8mm, široké 3 - 3,5mm a terčové květy jsou oranžové. Plodem je tmavěhnědá nažka délky 5 - 7mm s chmýrem délky 3 - 4mm.

### Cremanthodium nepalense

oblasti: Indie, Nepál, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Indii a Nepálu v trsech. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Spodní listy jsou vejčité až prakticky kulaté, zubaté, tupé, dlouhé 2 - 5cm a na spodní straně síťkovitě žilnaté. Květenstvím je žlutý převislý úbor, okvětní lístky jsou špičaté a dlouhé 0,8 - 1,5cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny, řízkami nebo dělením.

### Cremanthodium nervosum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu. Spodní listy jsou vejčité, zubaté, tupé, řapíkaté a dlouhé 5 - 9cm. Květenstvím je převislý úbor vyrůstající po 1 - 3ks, zákrov je ochlupený, okvětní lístky jsou eliptické, tupé a dlouhé 1



- 1,5cm.

### Cremanthodium nobile

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Spodní listy jsou obvejčité až prakticky kulaté, tupé, dlouhé 1 - 10cm a lodyžní listy jsou čárkovité. Květenstvím je žlutý převislý úbor, okvětní lístky jsou úzce kopinaté a dlouhé 2,5 - 3,5cm.

Vyhovují ji dobře propustné vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

### Cremanthodium oblongatum

oblasti: Nepál, Pákistán, Sikkim, Uttarákhand, V Himálaj, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste v Číně, Indii, Himálaji a Nepálu. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Spodní listy jsou podlouhlé až eliptické, tupé, hrubě zubaté, řapíkaté a dlouhé (2 -) 3 - 6 (i 8)cm, široké 1 - 2cm, řapík je na bázi pochvatý, lodyžní listy jsou úzce eliptické a přisedlé. Květenstvím je převislý úbor, zákrov je ochlupený, zákrovní lístky úzce kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 0,8 - 1cm, široké 3mm, okvětní lístky jsou podlouhlé, špičaté a dlouhé 1 - 2,5cm. Plodem je úzce eliptická nažka s chmýrem délky 5mm.

### Cremanthodium obovatum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v trsech. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Spodní listy jsou obvejčité až čárkovité, tupé, mohou být řídce zubaté, ochlupené a dlouhé 6 - 9cm. Květenstvím je převislý žlutý úbor vyrůstající po 1 - 4ks, zákrov je ochlupený, okvětní lístky jsou kopinaté a dlouhé 2 - 4cm.

Vyhovují ji vlhké kamenité půdy bohaté na živiny v polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

### Cremanthodium palmatum

oblasti: Bhútán, Sikkim, V Himálaj, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Indii, Himálaji a Bhútánu. Spodní listy jsou ledvinité, dlanité, dlouze řapíkaté, dlouhé 1,3 - 2,5cm, úkrojky jsou podlouhlé, hrotité a mohou být ochlupené. Květenstvím je převislý úbor.

### Cremanthodium petiolatum

### Cremanthodium phyllodineum

## Cremanthodium pilosum

oblasti: Sichuan

Roste v Číně. Spodní listy jsou podlouhlé až obvejčité, tupé, zubaté, ochlupené a dlouhé 2 - 6cm. Květenstvím je převislý úbor, zákrov je ochlupený, okvětní lístky jsou hnědě žilkované a dlouhé 1 - 3cm.

## Cremanthodium pinnatifidum

oblasti: Bhútán, Nepál, Sikkim, V Himálaj, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Indii, Himálaji, Bhútánu a Nepálu v trsech. Dorůstá výšky 8 - 15cm. Spodní listy jsou podlouhlé, asymetricky peřenodílné, zubaté, dlouhé 2 - 5cm a úkrojky jsou podlouhlé. Květenstvím je žlutý úbor, okvětní lístky jsou podlouhlé, uťaté, zubaté a dlouhé do 1cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

## Cremanthodium pinnatisectum

oblasti: Myanmar (Barma), Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru. Spodní listy jsou prakticky ledvinité, dlanité nebo peřenosečné, řapíkaté, dlouhé 2 - 4cm, úkrojky jsou kopinaté, hrotité a dlouhé 4 - 6mm. Květenstvím je převislý úbor.

## Cremanthodium potaninii

oblasti: Gansu, Sichuan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Spodní listy jsou vejčitesrdčité až kopinaté, 3roze zubaté, špičaté a dlouhé 1,5 - 2,5cm. Květenstvím je žlutý převislý úbor, okvětní lístky jsou zašpičatělé a dlouhé 1,5 - 2cm.

Vyhovují ji dobře propustné vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

## Cremanthodium prattii

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 25 - 40cm. Spodní listy jsou vejčité až podlouhlé, tupé, dlouhé 2 - 8cm a na spodní straně zelenobílé. Květenstvím je žlutý převislý úbor, zákrov je dlouze ochlupený, okvětní lístky jsou čárkovité a dlouhé 4 - 6mm.

Vyhovují ji středně vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

### Cremanthodium principis

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Spodní listy jsou podlouhlé až prakticky kulaté, zoubkaté, tupé, řapíkaté a dlouhé 2 - 5cm. Květenstvím je převislý žlutý úbor, zákrov je ochlupený, okvětní lístky jsou zubaté nebo laločnaté a dlouhé 1,6 - 2,5cm.

Vyhovují ji dobře propustné vlhké půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny, řízký nebo dělením.

### Cremanthodium pseudo-oblongatum

oblasti: Indie, V Himálaj, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste v Číně, Indii a Himálaji. Spodní listy jsou vejčité nebo podlouhlé, špičaté, tuhé, řapíkaté a dlouhé 2 - 5cm. Květenstvím je převislý úbor, okvětní lístky jsou úzce kopinaté a dlouhé 1,5 - 2,5cm.

### Cremanthodium pteridophyllum

### Cremanthodium puberulum

oblasti: Qinghai, Xizang (Tibet)

Roste v Číně. Spodní listy jsou podlouhlé až vejčité, mělce zubaté, tupé, ochlupené a dlouhé 3 - 9cm. Květenstvím je převislý úbor, zákrov je černý, ochlupený, okvětní lístky jsou čárkovité, špičaté a dlouhé 2 - 4cm.

### Cremanthodium pulchrum

oblasti: Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v trsech. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Spodní listy jsou ledvinité nebo vejčitěsrdčité, hrubě zubaté, tupé, řapíkaté, dlouhé 1 - 2cm a na spodní straně bledězelené. Květenstvím je převislý úbor, okvětní lístky jsou vejčitěkopinaté a dlouhé do 2,5cm.

Vyhovují ji vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

### Cremanthodium purpureifolium

oblasti: Nepál, Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu a Nepálu. Spodní listy jsou podlouhlé až vejčité, tupé, zubaté a dlouhé 4 - 8cm. Květenstvím je převislý úbor, zákrov je ochlupený, okvětní lístky jsou podlouhlé a dlouhé 1,5 - 2cm.

### Cremanthodium pyrolifolium

### Cremanthodium reniforme

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), Nepál, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste v Číně, Indii, Himálaji, Myanmaru, Nepálu a Vietnamu v trsech. Dorůstá výšky 30 - 40cm. Spodní listy jsou ledvinité až prakticky kulaté, zubaté, ochlupené, řapíkaté a široké 3 - 7cm. Květenstvím je žlutý převislý úbor, okvětní lístky jsou obkopinaté, tupé a dlouhé 1 - 2cm.

Vyhovují ji středně vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

### Cremanthodium retusum

### Cremanthodium rhodocephalum

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně. Lodyžní listy jsou ledvinité, dlaniť žilnaté, vroubkované, řapíkaté, dlouhé 1 - 4cm a vroubky jsou hrotité. Květenstvím je převislý úbor v počtu 1 - 4ks, okvětní lístky jsou obkopinaté a dlouhé 1 - 2cm.

### Cremanthodium sagittifolium

oblasti: Yunnan

Roste v Číně. Spodní listy jsou střelovité, špičaté, řídce zubaté, kožovité, řapíkaté a dlouhé 1,5 - 3cm. Květenstvím je převislý úbor, okvětní lístky jsou kopinaté a dlouhé 1,5 - 2,5cm.

### Cremanthodium sino-oblongatum

oblasti: Yunnan

Roste v Číně. Spodní listy jsou kopist'ovité, tupé, 3roze zubaté nebo zubaté, řapíkaté a dlouhé 2 - 5cm. Květenstvím je převislý úbor, okvětní lístky jsou obkopinaté, uťaté, laločnaté a dlouhé 1,3 - 1,6cm.

### Cremanthodium smithianum

oblasti: Myanmar (Barma), Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru. Spodní listy jsou ledvinité, dlanitě žilnaté, zubaté, červené a dlouhé 1 - 5cm. Květenstvím je téměř přímý až převislý úbor, okvětní lístky jsou podlouhlé a dlouhé 1 - 2cm.

### Cremanthodium spathulifolium

### Cremanthodium stenactinium

oblasti: Qinghai, Xizang (Tibet)

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy jsou kulatě ledvinité, zubaté, bíle ochlupené a dlouhé 0,7 - 2cm. Květenstvím je žlutý převislý úbor, zákrov je červenorůžovofialová, okvětní lístky jsou průsvitné a dlouhé 2,5 - 3,5cm.

Vyhovují jí vlhké štěrkovité půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkami.

### Cremanthodium stenoglossum

### Cremanthodium suave

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy jsou šedozelené, pomoučené, eliptické, tlustější, řapíkaté, dlouhé 10 - 20cm, lodyžní jsou přisedlé a kopinaté. Květenstvím je žlutý převislý úbor, úkrojky jsou úzce kopinaté a dlouhé do 3cm.

Vyhovují jí středně vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkami.

### Cremanthodium thomsonii

oblasti: Bhútán, Nepál, Sikkim, V Himálaj, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Himálaji, Bhútánu, Indii, Číně a Nepálu v trsech. Dorůstá výšky 25 - 50cm. Spodní listy jsou kulatě ledvinité, mělce vroubkované až hrubě zubaté, řapíkaté, široké 3 - 6cm a na spodní straně řídce ochlupené. Květenstvím je žlutý převislý úbor a okvětní lístky jsou dlouhé 1,6 - 2,3cm.

Vyhovují jí vlhké kamenité dobře propustné půdy v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkami.

### Cremanthodium trilobum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu. Spodní listy jsou vejčité, tuhé, tupé, vroubkované a dlouhé 2 - 6cm. Květenstvím je převislý úbor, okvětní lístky jsou 3laločné, obkopynaté a dlouhé 2 - 3cm.

### Cremanthodium variifolium

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 8 - 25cm. Spodní listy jsou eliptické až obvejčité, tupé, řapíkaté, dlouhé 1 - 5cm, lodyžní jsou menší a bohaté. Květenstvím je žlutý převislý úbor, okvětní lístky jsou tupé a dlouhé 1 - 1,5cm.

Vyhovují jí vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

### Cremanthodium wardii

### Cremanthodium yadongense

<https://www.rostliny.net/>