

Ctenolepis

čeleď: Cucurbitaceae

Ctenolepis cerasiformis

oblasti: Indie, Jemen, Maryland, Mosambik, Nigérie, Pákistán, Súdán, Zimbabwe

Roste od Nigérie po Súdán, Mosambik a Zimbabwe, dále v Jemenu, Indii a Pákistánu v podobě popínavého bohatě větveného keře. Palisty jsou dlouhé 0,7 - 1,5cm. Listy jsou dlouhé 3,5 - 10cm, téměř stejně široké, čepel je široce vejčité srdčitá, dlanitě 3 (i 5) laločnaté, cípy jsou úzce vejčité a řapíky jsou dlouhé 2 - 4cm. Květy jsou drobné, samčí květy vyrůstají po 5 - 10tičetných květenstvích s 2 - 4cm stopkami a mají 2 - 3mm stopku, samičí jsou samostatné a krátce stopkaté. Plody jsou kulovité až vejčité, průměru 1,3cm a obsahují 2 na okraji zploštělých semen délky 8mm a šířky 5mm.

Ctenolepis garcini

oblasti: J Indie, Srí Lanka

Roste v Indii a Srí Lance v podobě popínavky. Listy mají 3 - 5x dlanitě laločnaté. Plody obsahují 1 - 2 podlouhlá semena.

Ctenolepis lucorum

<https://www.rostliny.net/>