

Austrocedrus chilensis

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Araucanía, Aysén, Biobío, Chubut, J Andy, Los Lagos, Maule, Neuquén, O'Higgins, Río Negro, Santiago Metropolitan, Valparaíso

Roste v Andách v Čile a Argentině v podobě dvoudomého stálezeleného stromu s krátkým kmenem a úzkou, ve stáří naopak širokou kuželovitou korunou. Dožívají se věku až 1500let. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 25)m. Borka je hnědočervená, šupinatá a odlupuje se v pruzích. Větve jsou v mládí zploštělé. Listy jsou vstřícné, šupinovité, tlusté, zelené (i namodralé), postranní delší lícních, na vrcholu dovnitř zahnuté, špičaté, lícní tupé a na spodní straně se 2ma bělavými stomatálními pruhy. Samčí šištice jsou dlouhé 2 - 5mm, široké 1,5 - 3mm, samičí šištice jsou eliptické, dlouhé 0,8 - 1,4cm, široké 5 - 8mm, tvoří je 2 páry šupin, dolní jsou drobné, sterilní, horní fertilní a obsahují 2 páry semen délky 3 - 5mm, šířky 2 - 3mm s 2mi křídly délky 5 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Argentea' - listy bělavé
- 'Thornhayes Ghost' - listy stříbřité
- 'Viridis' - listy zelené bez stomatálních pruhů
- 'Viridis Compacta' - kompaktní nižší habitus

Vyhovují mu horské skalnaté a suché lesy. Odolává teplotám do -15°C.

<https://www.rostliny.net/>