

Dicoma

čeleď: Asteraceae

Roste v Africe a jihozápadní Asii. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Dicoma aethiopica

Dicoma alemannii-mazzocchii

Dicoma anomala

oblasti: Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Jihoafrická Republika (JAR), Mosambik, Tanzánie, Zambie

Roste v Africe jako trvalka s dřevnatějící bází. Stonek je podzemní, větvený, poléhavý až vzpřímený a řídce ochlupený. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité až mírně kopinaté a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je vrcholový úbor, vyrůstá samostatně nebo po několika ks, průměru 1,5 - 3cm, zákrovní listeny jsou tuhé, úzké, špičaté, okvětní květy chybí, terčové jsou bílé, růžové nebo fialové s mnoha bílými štětinami.

Vyhovují mu pastviny, stráně a kamenitá i písčítá místa.

Dicoma antunesii

Dicoma arenaria

Dicoma banqueolensis

Dicoma capensis

Dicoma carbonaria

Dicoma chatanensis

Dicoma cuneneensis

Dicoma dinteri

Dicoma elegans

Dicoma foliosa

Dicoma fruticosa

Dicoma galpinii

Dicoma gillettii

Dicoma hindiana

Dicoma incana

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru v podobě poloopadavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 6m. Borka je šedohnědá. Listy jsou krátce řapíkaté, eliptické až obkopinaté, zakulacené, mírně kožovité, zpravidla plstnaté, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 1 - 1,5cm a báze klínovitá. Květenstvím je prakticky přisedlý úbor v paždí listů, zákrov má délku do 1,5cm, zákrovní listeny jsou tuhé, kopinaté, špičaté, mohou být ochlupené, okvětní lístky chybí, terčové jsou úzce trubkovité, nažloutlé a délky do 1,5cm. Plodem je nažka délky 3mm s chmýrem.

Vyhovují mu suché lesy, křoviny a písčiny.

Dicoma kurumanii

Dicoma macrocephala

Dicoma montana

Dicoma nachtigallii

Dicoma niccolifera

Dicoma obconica

Dicoma paivae

Dicoma picta

Dicoma popeana

Dicoma prostrata

Dicoma schimperi

oblasti: Afrika, Arabský poloostrov, Pákistán

Roste v tropické Africe, Arabském poloostrově a Pakistánu jako trvalka. Stonek je vzpřímený. Listy jsou eliptické, vejčité nebo kopinaté, mohou být vroubkované, oboustranně ochlupené, dlouhé 2 - 2,5cm, široké 1,3 - 1,6cm a řapíky jsou dlouhé do 2cm. Květenstvím je úbor průměru 1,5 - 2 (i 2,5)cm, zákrovní listeny jsou bohaté, zašpičatělé, vlastní květy jsou oboupohlavné, trubkovité a žluté. Plodem je nažka s chmýrem.

Dicoma schinzii

Dicoma scoparia

Dicoma somalense

Dicoma squarrosa

Dicoma swazilandica

Dicoma thuliniana

Dicoma tomentosa

oblasti: Etiopie, Indie, Pákistán, Senegal

Roste v tropické Africe, Etiopii, Indii a Pakistánu jako trvalka nebo malý keř. Stonek je dřevnatý, větvený a hustě ochlupený. Listy jsou čárkovité až obvejčité, zašpičatělé, oboustranně ochlupené, přisedlé, dlouhé 12 - 16cm a široké 1 - 2cm. Květenstvím je diskovitý úbor, zákrovní listeny jsou úzce kopinaté, vnější menší, vnitřní dlouhé 1,3 - 1,4cm, ostnité, vlastní květy jsou oboupohlavné, trubkovité a hluboce 5tilaločné. Plodem je nažka s chmýrem.

Dicoma welwitschii

Další informace:

<https://botany.cz/cs/dicoma-anomala/>

<https://www.rostliny.net/>