

Triantha glutinosa

čeleď: Tofieldiaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Yukon, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v trsech. Dorůstá výšky 5 - 50cm. Listy jsou přízemní, mečovité, na bázi pochvaté, dlouhé 5 - 30cm, široké 2 - 6mm, lodyžní jsou max. 3 a zpravidla zakrnělé. Květenství je 3 - 30tkvěté, válcovité, občas přetřhané, žláznaté (včetně horní části lodyhy), dlouhé 1 - 6,5cm, vlastní květy jsou 6tičetné, oboupohlavné, seskupené po 3ks, krátce stopkaté, opatřené listeny i listenci, korunní lístky jsou úzce kopinaté, bílé až nažloutlé a dlouhé 4 - 5mm. Plodem je vejčitá až eliptická červenohnědá tobolka délky 3,5 - 7,5mm a obsahuje hnědočervená semena délky 1mm s přívěsky.

Vyhovují ji slatiny, vlhké louky, okraje potoků nebo rašeliniště a chlad.

<https://www.rostliny.net/>