

# Chrysothamnus viscidiflorus

čeleď: Asteraceae

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě větveného metlovitého keře. Dorůstá výšky do 1,2 (i 1,5)m. Větve mohou být v mládí pavučinovité. Kmínky mohou být ochlupené, borka je bílá až šedá a odlupuje se v plátech nebo vláknech. Listy jsou přisedlé, čárkovité, kopinaté nebo eliptické, špičaté až zašpičatělé, lepivé, mohou být ochlupené, zelené až šedozelené, zpravidla zvlněné, dlouhé 1 - 5 (i 7,5)cm a široké 0,1 - 1cm. Květenstvím je žlutý úbor v až 7cm širokém vrcholíku, zákrov je válcovitý až zvonkovitý, 3 - 5tiřadý, dlouhý 4 - 7mm, zákrovní listeny jsou podlouhlé, kopinaté až kopist'ovité, nestejně, hnědé až zelené, ochlupené, dlouhé 1 - 5mm, zpravidla s kýlnatě, s blanitými okraji, terčové květy jsou trubkovité, v počtu (3 -) 4 - 5 (i 6)ti ks a dlouhé 3,5 - 6,5mm. Plodem je nažka délky 2,5 - 4,2mm s chmýrem délky 3,5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. axillaris - Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Utah
- subsp. lanceolatus - Jižní Dakota
- var. latifolius
- subsp. planifolius - Arizona
- subsp. puberulus - Arizona, Kalifornie, Idaho, Nevada, Oregon, Utah
- var. serrulatus - Utah, Nevada
- var. stenophyllus
- subsp. viscidiflorus/var. viscidiflorus

Vyhovují mu travnaté až křovité lesostepi nebo polopouště.

<https://www.rostliny.net/>