

Luina

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe jako polokeř. Stonek je větvený a ochlupený. Listy jsou střídavé, kopinaté až vejčité, mohou být zubaté a na spodní straně ochlupené. Květenství tvoří 4 - 12 úborů postrádajících jazykovité květy, terčových květů bývá 11 - 23 v barvě žluté. Plodem je nažka délky 3 - 4mm s chmýrem délky 0,8 - 1cm.

Luina hypoleuca

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste v Kanadě a USA v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Pod zemí vytváří kulový kořen. Povrch je bíle plstnatý. Listy jsou kopinaté nebo vejčité a přisedlé. Květenstvím je okolík tvořený 10 - 17ti bleděžlutými úbory s plstnatým zákrovem.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Luina serpentina

oblasti: Oregon

Roste v USA v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Listy jsou kopinaté, oboustranně ochlupené, řapíkaté a dlouhé 5 - 12cm. Květenstvím je žlutý úbor, zákrovní listeny jsou čárkovité a dlouhé 1cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>