

Stephanomeria

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Stephanomeria cichoriacea

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě polokeře. Dorůstá výšky i více než 1m. Stonek je ochlupený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou kopinaté, zpravidla zubaté, dlouhé 18 - 20cm, žilnatina je ochlupená a lodyžní listy jsou menší. Květenství tvoří několik růžových úborů s válcovitou bází délky 1 - 2cm, okvětních lístků je 10 - 15ks a mají délku do 2cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Stephanomeria diegensis

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv sever

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka.

Stephanomeria elata

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA jako jednoletka. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou dlouhé 10cm a záhy opadávají. Květenstvím je úbor s 15 - 16ti růžovými okvětními lístky délky 6 - 7mm. Plodem je nažka.

Stephanomeria exigua

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Kalifornský záliv sever, Kolorado, Nevada, New York, Nové Mexiko, Oregon, Texas, Utah, Wyoming

Roste v USA a Mexiku jako jednoletka, dvouletka anebo i trvalka.

Stephanomeria fluminea

oblasti: Wyoming

Roste v USA jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 15 - 40cm. Stonky jsou plstnaté. Listy jsou úzce obkopinaté, mohou být řídce zubaté, plstnaté a dlouhé 3 - 6cm. Květenstvím je růžový úbor.

Vyhovují jí štěrkové půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Stephanomeria guadalupensis

oblasti: Kalifornský záliv, Karibik

Roste na ostrově Gaudeloupe a v Kalifornském zálivu.

Stephanomeria hitchcockii

Stephanomeria lactucina

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon, Sierra Nevada (USA)

Roste v USA jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky (10 -) 30 - 60cm. Listy jsou čárkovité až kopinaté, řídce zubaté a dlouhé 2 - 8cm. Květenstvím je růžový úbor se zákrovem délky 1,2 - 1,5cm a 10ti okvětními lístky délky 0,8 - 1,1cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují ji chudé písčité suché půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Stephanomeria malheurensis

oblasti: Oregon

Roste v USA jako jednoletka nebo trvalka.

Stephanomeria mexiae

oblasti: Chihuahua

Stephanomeria monocephala

oblasti: SZ Mexiko

Roste v Mexiku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou obkopinaté, špičaté, řídce žláznatě ochlupené, mohou mít 1 - 3 zuby a délku 1 - 4cm. Květenstvím je růžový úbor průměru 1,5 - 2cm, zákrov je válcovitý, listeny kopinaté a vnější střežovitě překryté.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

Stephanomeria paniculata

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste v USA jako jednoletka nebo trvalka. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou čárkovité a dlouhé 10cm. Květenstvím je úbor se 4 - 6ti růžovými okvětními lístky s délkou do 1,4cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Stephanomeria parryi

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Utah

Roste v USA jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Pod zemí vytváří křivý kořen. Listy jsou kopinaté, laločnaté a při bázi dlouhé 2 - 8cm. Květenstvím je vrcholík z úborů, zákrov je dlouhý 1,2 - 1,6cm, vnější listeny jsou ohnuté, okvětních lístků je 13 - 14ks a jsou dlouhé 1,1 - 1,5cm. Plodem je nažka s chmýrem.

Vyhovují jí chudé písčité půdy na plném slunci.

Stephanomeria pauciflora

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, S Mexiko, Texas, Utah, Wyoming

Roste v USA a Mexiku v podobě polokeře. Stonek je rozložitě větvený. Listy jsou zejména přizemní. Květenstvím je úbor se 3 - 6ti okvětními lístky vytvářejícími nejdříve trubku a v barvě světlefialové. Plodem je nažka.

Stephanomeria runcinata

oblasti: Alberta, Kolorado, Montana, Nebraska, Saskatchewan, Severní Dakota, Utah, Wyoming

Roste v Kanadě a USA v podobě polokeře v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Spodní listy jsou úzce kopinaté, kracovité, peřenolaločné, dlouhé 3 - 7cm, lodyžní jsou pouze listenovité. Květenstvím je růžový úbor.

Vyhovují jí hluboké dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Stephanomeria tenuifolia

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA a Kanadě v podobě polokeře. Dorůstá výšky 15 - 60cm. Květenstvím je světlorůžový úbor. Plodem je nažka s chmýrem.

Stephanomeria thurberi

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Sonora

Roste v USA a Mexiku jako trvalka.

Stephanomeria virgata

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon

Roste v USA jako jednoletka. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Stonek je hustě větvený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou podlouhlé, laločnaté, lodyžní listy jsou menší, čárkovité a celokrajné. Květenstvím je úbor s 5 - 9ti světlefialovými okvětními lístky. Plodem je nažka s chmýrem.

<https://www.rostliny.net/>